

ప్రసిద్ధ


ఆంధ్రీయాశాసన యోగములు.

— 12/46 —

సేతుబ్రదర్సు,

మద్రాసు,

[లేక] మచిలీపట్నము.



మద్రాసు:

ఇండియా ముద్రణాలయమందు ముద్రితము.

1921

సర్వస్వామ్య సంకలితము]

[రూ. 1—0—0

పీఠిక.

సృష్ట్యాది వ్యాధులతోగూడ వైద్యులును ప్రబలుచుండిరి. కాని, తక్కినజంతువులకు వలె మనుజునికి సహజముగ వైద్యజ్ఞాన మలవడదు. గృహమార్జనమునకు జీర్ణాస్వస్థత యేర్పడినపు డొకానొక సమయమున నెద్దియో ఆకలములను వాంతికారిగ నుపయోగించుటను మనము చూచుచునేయుందుము. ఈవైద్య జ్ఞానమును సేకరించుటకు మానవుడు విశేషముగ బూర్వతరముల వారి యనుభవములను, గొంతవఱకు దనస్వానుభవమును, వినియోగించు చుండవలయును. ఏ ఔషధ ప్రకరణ మెట్లుగా బనిచేయుచుండునో వైద్యశాస్త్ర వేత్తలు మనలకు దెలిపియుండ నాయనుభవములను మనము గ్రహించి నడచుకొనుట తేమకరమై యుండును.

శరీరమునందలి అంతరావయవములలో ప్రాణాధారములని చెప్పదగినవి ముఖ్యముగ మూడుండి యున్నవి. అవి యేవనగ:—మెదడు, హృదయము,

శ్వాసకోశములు. ఈమూటిలో నేది తన కార్యక్రమమును నిర్వర్తింపక పోయినను శరీరము నిర్జీవమగు చున్నది. కార్జము, జీర్ణాశయము, ప్రేగులు, స్త్రీహము, మూత్ర గ్రంథి మొదలగునవియు దమ తమ కార్యక్రమముల సరిగ నిర్వర్తించ వలయును. లేనిచో వ్యాధి అంకురించి శరీరము శుష్కత నందుచుండును. ఈకార్య క్రమములను సరిచేయుటకు గావించు ప్రయత్నములే వైద్యశాస్త్రము యొక్క లక్ష్యములై యున్నవి. ఏదైన నొకవ్యాధికి చికిత్స చేయుటకు పూర్వము, యే అవయవ మస్వస్థత నందియున్నదో, అస్వస్థత యెట్టిగతి ననుసరించి యుండినదో, రోగియొక్క కొదువ శరీర స్థితు లెట్లుండి యున్నవో, విచారించుట ముఖ్యవశ్యకమై యుండును. ఈ గ్రంథమును బ్రకటించుట యందు ప్రసిద్ధ వైద్యశాస్త్రజ్ఞుల అనుభవములనే బకటించి యుంటిమిగాని మాస్వాభిప్రాయములను నెలిబుచ్చి యుండలేదు.

వ్యాధియొక్క ప్రారంభమునందే క్రమమయిన చికిత్సను చేసినయెడల మిగుల నుపయోగముగ నుండగలదు. వైద్యశాస్త్రజ్ఞానము మనుజులను దీర్ఘజీవితులుగ జేసినను జేయకపోయినను, వ్యాధియం

దలి బాధను గొంతవలకు నివారించి, మరణ
హింసను దగ్గించుననుటకు సందియములేదు ఔష
ధముల నిచ్చుటవలన స్వభావ సిద్ధమగు శరీర జవ
సత్వములకు దోడ్పడుచుందుముగాని ప్రాణమును
బోయజాలము.

ఇదివరలో మేము ప్రకటించియుండిన ఆంగ్లేయ
వైద్య గ్రంథములకు దోడుగ నీగ్రంథమును గూడ
ప్రకటించి యీపాశ్చత్య వైద్యశాస్త్రజ్ఞాన ఫలిత
ములను సాధ్యమైనంత వరకు ఆంధ్ర లోకమునకు
వెల్లడిచేయుట మావిధ్యుక్త ధర్మముగా నెంచి,
యీ చిన్న పుస్తకమును వెలువరించి యుంటిమి.
అందలి గుణాగుణములను మాచదువరులే గ్రహిం
తురుగాక !

మచిలీపట్టణము,
10—9—21. }

ఇట్లు,
నే తు బ్ర ద ర్శు.

వి ష య సూ చి క.

	పుటలు.
కంపౌండింగు, తూనిక, మొదలగునవి	1-9
ఔషధయోగములు	10-94
అనుక్రమణిక I	95-98
అనుక్రమణిక II	99-110
వ్యాధిసూచిక	111-113
అనుబంధము	114

ప్రసిద్ధి

ఆంగ్లేయాశాసన. యోగములు.

ఈ చిన్నిపుస్తకము మొక్క యద్వైతము, న్యాయములయం దుపయోగింపదగి మిగుల వాడు లోనుండు ఆశాసనయోగములయొక్క వివరముల నుచ్చుట యయి యున్నది.

కంపౌండింగ్ (Compounding.)

ఈసందర్భమున నాశాసనముల మిశ్రమమును జేయు విషయమై కొంచెముగా జెప్పదగియున్నది. దీనికి ఆంగ్లేయ భాషయందు కంపౌండింగు అందురు. ఈపనిని బహుజాగ్రత్తతోడను, పరిశుభ్రతతోడను జేయుటయేగాక; తూనిక యందుగాని కొలతయందుగాని కొంచెమైనను హెచ్చుతగ్గులు లేకుండగ నాశాసనముల సేకరించుటయు, ముఖ్యమై యున్నది. ఈ పనిని జేయునప్పుడు పరధ్యానము లేకుండగ బహు శ్రద్ధాభక్తులను వహించియుండ

వలయును. ఏలయున, నొకవస్తువు నుపయోగించు
టకు బదులుగ నింకొకవస్తువు నుపయోగించిన
యెడల ప్రాణాపాయము దటస్తింతుటయుగలుగును.

తూనిక.

బౌద్ధములను దూచుటయందు బహు ఖచిత
ముగా నుండవలయును. ఒక బౌద్ధునకంటె నెక్కు
వగ దూచుట యెన్నడును సామాన్యముగ దటస్తిం
చదు. కొన్ని విషయములలో ద్రాముల వఱకు
మాత్రము దూచుటయును, మఱికొన్ని విషయ
ములలో గ్రెయినుల వరకు మాత్రమే దూచుట
యును దటస్తింతుచున్నది. ఈతూనికకొఱకై మధ్య
స్థంభమును గలిగి యుండి యొకవైపున గాజు
పల్లెము గలిగి యుండిన త్రాసును సంపాదించి
యుండుట మంచిది.

ఈ గాజుపల్లెము యొక్క ముఖ్యత యేమనగా,
పులుసు పదార్థముల దూచినను మాలిన్య మేర్పడ
జాలదు. మందులను వేయుటకు గాజుపల్లెమును,
తూనికరాళ్లను వేయుటకు రెండవదైన యిత్తడి
పల్లెమును, ఉపయోగింపనగును. ప్రతితడవయును
తూనిక అయిన పిమ్మట రెండుపల్లెములను శుభ్ర

ముగా గుడ్డతో దుడిచివేయుట మిగుల మంచిది. ఇందువలన త్రాసునందు హెచ్చు తగ్గు తూనికలు రాకుండగ జాగ్రతగ జేయుటకు వీలుగ నుండును.

రెండు గ్రెయినులకు లోపుగ దూచనగు అభిని (Morphine) విషముష్టి (Strychnine) మొదలగు బలీయమగు ఔషధముల దూచుటకు బహు సున్నితమైన వేరు త్రాసు నుపయోగించుచు, ద్రాములను దూచుట కుపయోగించు త్రాసునే యిందుల కుపయోగింపకుండ నుండవలయును.

కొలత.

ఔషధములను గొలచుట తేలి కయినదే కాని, తక్కిన వాటి యందువలె దీనియందును జాగ్రతయు నలవాటును నుండవలయును. ఈ కొలతలు గుర్తుపెట్టుబడిన వివిధాకారములు గల గాజు కొలతలు అమ్మబడును. ఈకొలతగుర్తులను సూచించ గీతలు రెండువైపులను అనగా ముందు వెనుక వైపులను వేసియుండవలయును. కొలగ్లాసును యెడ మచేతియొక్క బొటనప్రేలునకును పిమ్మటి రెండు ప్రేళ్లకును మధ్యగా బట్టుకొని, కంటితో సమామైన యెత్తునకు దీసికొని రావలయును. దేనినుం

యైతే మందును బోయవలయునో ఆబుడ్డిని కుడి చేతితో బట్టుకొని, దానియొక్క మూతను యెడమ చేతి చిన్నవ్రేలితో బట్టుకొని, యుండవలయును. ఈమూతను (కార్కు) యీప్రకారము బట్టుకొనుటకై కొంతవఱకు అలవాటు కావలయును గాన, అట్లు చేయుటలో జారవిడిచి దానిని బగుల గొట్టు అపాయము నుండి తొలగుటకు గాను, కొలచు నప్పుడు దానిని విడిగా నుంచుటయే యుత్తమము.

కొలతను సరిగా గుర్తించుటకుగాను ముందు వెనుకవైపుల గుర్తులకు రెండువైపులను లోని ద్రవపదార్థము సమానపు యెత్తుగ నుండునటుల జూచు కొనవలయును. ద్రాములను గొల్చుటకు పెద్దదైన ఔన్ను కొలగ్లాసు ఉండును. మినిములను గొల్చుటకు చిన్నదైన ద్రాముకొలగ్లాసు ఉండును. ఔన్ను కొలగ్లాసులో మినిములను గొల్చుటకు పయోగింప దగదు. ఇట్లు చేయుటలో ఖచిత మైన కొత్తకు భంగము కలుగుట తటస్థించును.

మిశ్రితౌషధములు (Mixtures.)

మిశ్రితౌషధములను జేయుటయందు, నియోగింపబడిన ఔషధములను కొత్తల ప్రకారము ఒక

పెద్దబుడ్డిలో గలుపుటయే అయియున్నది కాని, దీనిని పద్ధతి ప్రకారమును, బహు మెలకువతోడను, జేయవలసియుండును. విశేషమైన యనుభవముండి ననేతప్ప, నియోగింపబడిన ఔషధములబుడ్ల నన్ని యు నొకచోటబెట్టుకొని క్రమప్రకార మొక్కొక దానినుండియే వలసినదానిని గైకొనిన పిమ్మట యేమందుబుడ్డిని దానిదాని స్థానమం దుంచ వలయును.

మిశ్రితౌషధములను జేయుటయందు క్రమము యేమనగా:—టింక్చర్లనుగాని యితర ద్రవపదార్థ ములనుగాని ముందుగా కొలచి, మందును బోయు టకు యేర్పడిన బుడ్డిలో బోయవలయును. వీటిని ముందుగాగలిపి, షరబత్ (Syrup) వగైరాల నే మయినను గలుపుట అవసరమున్నచో బిమ్మటగలిపి చివరగా నవసరమగు నీటినిగాని కషాయమును (Infusion) గాని కలుపవలయును. ఎక్కువనీటిలో విడివిడిగా నీయకౌషధములను గలుపుటకంటె పై పద్ధతి ప్రకారము చేయుట మంచిది. ఒక ఔషధ యోగము (Prescription) నందు, 8 ఔన్సుల మిశ్రితౌషధమునకు రెండు ఔన్సుల టింక్చరులును,

ఒక ఔన్ను జిగురు (Mucilage) ను, 5 ఔన్నుల జలమును, నియోగింపబడిన యెడల, టింక్చర్లకు ముందుగా నీ జిగురును గలిపినయెడల నంతయు ముద్దయగును; అట్లు గాకుండునటుల నీటిని గలిపిన పిమ్మట నీ జిగురును చివరగా గలుపవలయును; లేదా, యీజిగురును అవసరమగు నీటిలో గలిపి యుంచుకొని, అట్టి నీటిని యీ టింక్చర్లకు గలుపవలయును. ఇట్టివేయగు నితర బాధకము లేమయినను దటస్థించినచో సామాన్యజ్ఞానము వలనను అనుభవమువలనను గ్రహించి సర్దుబాటు చేసికొనవచ్చును. ఒక్కవిషయమునమాత్రము, బహుజనులూ అశ్రద్ధచేసెడి దైనను, బహుజాగ్రతను వహించదగిన యంశమై యున్నది. మిగుల విషపదార్థమైన దానిని, అనగా నాభి (Aconite), పాషాణము (Arsenic), విషముష్టి (Strychnine) మొదలగు నవి ఔషధయోగమునందు నియోగింపబడిన యెడల నీటిని జివరగా జేర్చుటను ముఖ్యసూత్రముగా బెట్టుకొనవలయును; ఇట్లు చేయుటవలన నీయశాషధములను పొరబాటుగానైనను రెండు సారులు చేర్చుట తప్పిపోవును; ఇట్టిది ఒకటికి రెండు సార్లు వేసినయెడల ప్రాణాపాయము తటస్థించును.

అన్ని మిశ్రితౌషధములను జివరకు బాగుగ గలుపుట మంచిది.

బిస్మత్ సబ్ నైట్రస్ (Bismuth Subnitras) మొదలగు కొన్ని వస్తువులు నీటిలో గలువవు. అట్టివాటిని నీటితో జేర్చి, జిగురుతో గలిసిననీళ్లనుబోసి, మార్బర్ (రాతిరోలు) లో గలియ బెట్టినయెడల గలిసిపోవును.

జలము.

మిశ్రితౌషధములయందు పయోగింపబడు జలము, ఆవిరి చల్లార్చబడి చేయబడినదైనయెడల, శ్రేష్ఠము. అట్టిది వీలుకానియెడల సామాన్యముగ ద్రాగెడి నీటిని మసలగాచి చల్లార్చి ఉపయోగింపనగును. ఇట్లు మసలగాచుటవలన నందలి క్రిమిజాలములన్నియు నశింపు నందును.

మోతాదు.

ఇందలి మోతాదులు, సామాన్యగతులయందు, వయస్కుల కేర్పరుపబడియున్నవి. శరీరతత్వమును, ఇతర సందర్భములను అనుసరించి మోతాదులందు వివేచనయుతమగు కొద్ది మార్పులను జేసికొనినను జేసికొనవచ్చును. పటిమ తక్కువవారికిని, దుర్బలు

లకును, పసివారలకును మోతాదును తగ్గించవలసి
యుండును. సుకుమారులగు స్త్రీలకును అదేప్రకా
రము మోతాదును తగ్గించవలసి యుండును.

డాక్టరు యంగ్ గారియొక్క పద్ధతినిబట్టి వయస్కు
వకు నిర్మితమైనమోతాదును $\frac{\text{రోగియొక్క వయస్సు}}{\text{రోగియొక్క వయస్సు} + 12}$
చే గలిగిన భిన్నము ప్రకారము, అసలు మోతాదు
నందు భాగము నేర్పరచి యియ్యవలయునని స్థిర
పరచి యున్నారు.

ఇందు, ఈక్రింది సూచనాక్షరములను గమ
నింప నగును. ద్రా||=ద్రాము ; గ్రె||=గ్రెయిను ;
మి||=మినిము ; ఔ||=ఔన్సు. సాలిడ్ అనగా ఘన
పదార్థము. లిక్విడ్ అనగా ద్రవపదార్థము.

ఘనపదార్థముల తూనిక

60 గ్రెయినులు	1 ద్రాము
8 ద్రాములు	1 ఔన్సు
12 ఔన్సులు	1 పౌను

ద్రవపదార్థముల కొలత.

60 మినిములు	1 ద్రాము
8 ద్రాములు	1 ఔన్సు

20 ఔన్నులు

1 పైంటు

8 పైంట్లు

1 గాలను

ఘనపదార్థములకు, త్రాసును తూసికరాళ్లును ఉపయోగించవలసి యుండును. ద్రవపదార్థముల యందు, గ్రెయినులకు బదులుగా మినిములు వాడవలసి యుండును. 5 మినిములకు లోపుగా నున్న యెడల చుక్కలుగా వాడవలసి యుండును.

వయస్కునకు మోతాదు ఒక ఔన్ను అయి యున్న ఔషధము, ఒక నెలకును ఆరు నెలలకును మధ్య వయస్కునందున్న శిశువునకు, ఘనపదార్థ మయియున్న యెడల 24 గ్రెయినులును, ద్రవ పదార్థమయి యున్న యెడల 24 మినిములును, యియ్యవలయును. వయస్కునకు మోతాదు 20 గ్రెయినులుగాని 20 మినిములుగాని అయియున్న యెడల, అదేమందు 7 సం॥ ల వయసుగల పిల్లవానికి, ఘనపదార్థమయి యున్న యెడల 7 గ్రెయినులును, ద్రవపదార్థమయి యున్న యెడల 7 మినిములును, ఉపయోగించ వలయును ; ఒక నెల వయసునం దున్న శిశువునకు ఒక గ్రెయిను గాని, ఒక చుక్క గాని యియ్యవలసి యుండును.

✓గర్భస్రావము (Abortion)

క్విసీన్ సల్ఫేట్	10 గ్రె.
యక్టైన్ యెర్గాట్ లిక్విడ్	1 గ్రా.
ఆసిడ్ సల్ఫూరిక్	30 మి.
టింక్చర్ డిజిటాలిస్	20 మి.
జలము.	3 ఔ.

ఒక ఔన్ను మోతాదులో దినమునకు మూడు సార్లు లియ్యవలయును.

జలోదరము (Ascites)

(1) పల్విస్ డిజిటాలిస్	1 గ్రె.
పల్విస్ సిల్లే	1 గ్రె.
రసభస్మము	1 గ్రె.

యక్టైన్ జన్నన్ మాత్రయగుట కవసరమగునంత. ఒక్కొక్కమాత్ర చొ॥ దినమునకు రెండు సార్లులు.
(లేక)

(2) పొటాష్ ఆసిటస్	45 గ్రె.
కెఫీన్ సిట్రస్	6 గ్రె.
జలము	3 ఔ.

ఒక ఔన్ను చొ॥ దినమునకు మూడుసార్లులు.

చుండు (Dandruff)

క్లోరల్ హైడ్రేట్	1 ద్రా.
టార్టారిక్ ఆసిడ్	1 ద్రా.
సీమ ఆముదము	$\frac{1}{2}$ ద్రా.
ఆల్కహాల్	1 ఔ.
జలము	1 ఔ.

బట్టతల (Alopecia)

సల్ఫర్ ఆయింట్ మెంట్	4 ద్రా.
క్రయిసార్బయిన్	1 ద్రా.
ఆలిఫ్ ఆయిల్	$1\frac{1}{2}$ ఔ.

లేక

స్పిరిట్స్ అమ్మోనియా ఆరోమేటిక్	1 ఔ.
స్పిరిట్ రోజ్ మేరీ	1 ఔ.
గ్లిసెరిన్	1 ఔ.
టింక్చర్ కెంతారిడీస్	4 ద్రా.
పన్నీరు	$4\frac{1}{2}$ ఔ.

వీటిని బాగుగాగలిపి వెండ్రుకలయొక్క కుదు
ళ్ళలో బాగుగా రుద్దవలయును.

ఋతుస్రావముయొక్క క్షీణత లేక

నిలుపుదల (Amenorrhoea)

(1) పొటాస్ పర్మాంగనస్ 1 గ్రె.

కెయొలిన్ - మాత్రగాజేయుటకు వీలగునంత.
దినమునకు రెండుసారులు.

(లేక)

(2) రిడ్యూస్డ్ ఐరన్ 36 గ్రె.

ఫెర్రయి ఆర్రెనస్ 1½ గ్రె.

యక్టెస్క్రిప్ట్ ఆఫ్ నక్సువామికా 3 గ్రె.

క్విసీన్ సల్ఫేట్ 12 గ్రె.

యక్టెస్క్రిప్ట్ ఆఫ్ జిప్సమ్ 24 గ్రె.

వీనినన్నిటిని గలిపి 18 మాత్రలుగా జేయవలెను. అరమాత్రనుండి ప్రారంభించి క్రమముగా గొక మాత్రకు హెచ్చింపుచు దినమునకు మూడు గారులు భోజనానంతరము యియ్యవలయును. ఈ మాత్రల నుపయోగించుట క్రమముగా మానవలయునుగాని ఆకస్మికముగా నాపవలదు. ఆర్రెనిక్ (పాషాణము) కొందరి జీర్ణతత్వమునకు సరిపడక పోవచ్చును. అట్టివిషయములలో దానిని మాత్రల నుండి పూర్ణముగా త్యజింపవచ్చును.

ఉబ్బసము (Asthma.)

(ఉద్రుతగతియందు)

పోటాస్ అయోడైడ్	9 గ్రె.
టింక్చర్ బెలడోనా	15 మి.
టింక్చర్ లావేలియా యితర్	30 మి.
స్పిరిట్స్ అమ్మోనియా ఆరోమేటిక్	1 ద్రా.
స్పిరిట్స్ క్లోరోఫారం	30 మి.
జలము	3 షె.

ఒక్కొక్క షెన్సు చొ॥ దినమునకు మూడు సార్లు.

కురుపులు, వ్రణములు, రాచకురుపులు.

Boils, Abscesses, Carbuncles.

- (1) 1 భాగము కార్బాలిక్ ఆసిడ్ ను 10 భాగములు గ్లిసరీన్ తో గలిపి పైన రాయవలయును.
- (2) వేడికాపడములును, పిండికట్లును.
- (3) హూమోపతీ వైద్యశాస్త్రజ్ఞులు టింక్చర్ ఆర్నికో ఒకచుక్కను ఒక షెన్సు జలములో గలిపి మూడుగంటల కొకసారి లోని కియ్యనగు నని సూచించిరి.

పాండురోగము (Anaemia.)

ఫెర్రయియెట్ అమ్మోనియా సిట్రేస్
యక్షాస్రక్తు నక్సువామికా ద్రవము
లై కర్ ఆర్సెనికాలిస్
గ్లి సరీస్
జలము

1 ఔ.చొ॥ దినమునకు రెండుసార్లు భోజన

కురుపులు (Boils.)

(1) కార్నియం సల్ఫ్యురైడ్

మాత్ర లగుటకు అవసరమైనంత
జన్వన్ తో గలిపి 100 మాత్రలుగా జేయ
దినమునకు మూడు మాత్రల ను
లయును.

2) బోరిక్ ఆయింట్ మెంట్

ఇక్టీయాల్

ప్లెక్సీబిల్ కలోడియం

వీనినన్నిటిని గలిపి కురుపులకు
వలయును.

6 సం॥ ల వయస్సుగల బిడ్డలకు ఉబ్బసము.

ఫోటాస్ అయోడైడ్	6 గ్రె.
అమ్మోనియా కార్బనస్	3 గ్రె.
వైనం ఇపికాక్	15 మి.
సిరప్ టోలు	1 ద్రా.
స్పిరిట్స్ క్లోరోఫారం	10 మి.
జలము	3 ఔ.

ఒక్కొక్క ఔన్ను చొ॥ దినమునకు మూడ సార్లు.

కనురెప్పల ఉబ్బదల. (Blepharitis.)

బోరిక్ ఆసిడ్	5 గ్రె.
లానోలీన్	1 ద్రా.

కనురెప్పల అంచులను రాయవలయును.

గొంతు బొంగుపోవుట

(హిస్టీరియా సంబంధమగు) Aphonia.

జింక్ వెలీరియేనస్	1 గ్రె.
-------------------	---------

కెయాలిన్ మాత్రయగుటకు అవసరమగు
నంత. ఒక్కొక్కమాత్ర చొ॥ దినమునకు రెండు
సార్లు.

కాలినగాయములు (Burns.)

(1) అవిసినూ నెయును (లేక కొబ్బరినూ నె) సున్న పు
నీళ్లును సమానభాగములుగ కల్వములో వేసి
మర్దించి—దీనిని గాయములపైన రాయవల
యును. దీనికే నవనీత మందురు.

(2) బోరిక్ ఆసిడ్ 15 గ్రె.
గ్లిసరీన్ 1 ద్రా.
ఆలివ్ ఆయిల్ 1 ఔ.

వీని నన్నిటిని గలిపి పైన రాయవలయును.

రోమ్ముపడిసెము (Bronchitis.)

పోటాస్ సిట్రస్ 1 ద్రా.
లైకర్ అమ్మోనియా సిట్రస్ 6 ద్రా.
వైనం ఇపికాక్ 30 మి.
ప్పరిట్స్ క్లోరోఫారం 5 మి.
జలము 3 ఔ.

ఒక్కొక్కఁజేర్చు చొ॥ దినమునకు మూడుసారు
లియ్యవలయును.

రోముపడిసెము

[1 సం॥ వయసుగల బిడ్డకు తీవ్రస్థితియందు)

పోటాస్ సిట్రస్	5 గ్రె.
లైకార్ అమ్మోనియా సిట్రస్	1 గ్రా.
వైనం ఇపికాక్	10 మి.
సిరప్ టోలు	30 మి.
ఆక్వా క్లోరోఫారం	5 ఔ.

3 గంటల కొక ఔన్ను చొ॥ యియ్యవలయును.

రోముపడిసెమునకు లోనకు వాసనజూచుట.

టింక్చర్ బెంజాయిన్ కో	3 గ్రా.
యూకలిప్టస్ ఆయిల్	1 గ్రా.
క్రియసోట్	$\frac{1}{2}$ గ్రా.

ఈ మిశ్రితౌషధమునుండి ఒక గ్రామును ఉడుకు నీటిలో వేసి వాసన జూడవలయును.

బాధతో గూడిన పుండు (Cancer.)

బాధను తగ్గించుటకుగాను $\frac{1}{2}$ గ్రాము సిట్రిక్ ఆసిడ్ ను 4 ఔన్నుల జలములో గలిపి—లింట్ను యిందులో దడిపి పుండుపైన వేయవలయును.

ధాతునష్టము.

(మూత్రగ్రంథులయొక్క క్షీణదశ.)

(Bright's Disease.)

- (1) ఫెర్రయియెట్ అమ్మోనియా సిట్రస్ 15 గ్రె.
 లైకర్ ప్రిక్సీన్ 6 మి.
 గ్లిసరీన్ 45 మి.
 స్పిరిట్స్ క్లోరోఫారం 20 మి.
 జలము 3 ఔ.
 ఒక్కొక్క ఔన్ను చొ॥ దినమునకు మూడు
 సార్లు.

- (2) తియోసిన్ సోడా ఆసిటేట్ 15 గ్రె.
 కెఫీన్ సిట్రస్ 9 గ్రె.
 టింక్చర్ డిజిటాలిస్ 15 మి.
 జలము 3 ఔ.
 ఒక్కొక్క ఔన్ను చొ॥ దినమునకు మూడు
 సార్లు.

తేనేటీగ కాటు.

దాల్చినీ అరఖు (Cinnamon Oil) ను మైదాన
 రాయవలయును.

నల్లులు (Bed-bugs.)

- (1) పెట్రోలియం 3 ఔన్సులను 100 ఔన్సుల జలములో గలిపి నల్లులుండు స్నానములలో బోసిన నవి నశించగలవు.
- (2) గంధకపు పొగ వలన గూడ నల్లులు నశించి పోవును.

తిమరువాయువు (Beri-beri.)

- | | |
|--------------------------|--------|
| (1) టింక్చర్ నక్సువామికా | 15 మి. |
| టింక్చర్ స్ట్రాఫాంతస్ | 15 మి. |
| స్పిరిట్స్ క్లోరోఫారం | 30 మి. |
| జలము | 3 ఔ. |

ఒక్కొక్క ఔన్సు చొ॥ దినమునకు మూడుసార్లు లియ్యవలయును. (లేక)

- | | |
|----------------------------------|----------|
| (2) ఫెర్రు యెట్ క్వీసిన్ సిట్రస్ | 10 గ్రె. |
| లైకర్ ఆర్సెనికాలిస్ | 4 మి. |
| గ్లిసరీన్ | 20 మి. |
| స్పిరిట్స్ క్లోరోఫారం | 20 మి. |
| జలము | 2 ఔ. |

ఒక్కొక్క ఔన్సు చొ॥ రెండు సార్లు భోజనానంతరము లియ్యవలయును.

దశ (Cough.)

- | | |
|--------------------------------|---------|
| (1) టింక్చర్ క్యాంఫర్ కో | 3 ద్రా. |
| స్పిరిట్స్ అమ్మోనియా ఆరోమేటిక్ | 2 ద్రా. |
| జలము | 8 షా. |

దీర్ఘవ్యాపితమయి శ్వాససంబంధమూలగు దగ్గుల
యందు ప్రతి రెండు లేక మూడు గంటలకు ఒక
బౌన్సు చొ॥ యియ్యవలయును.

- | | |
|--------------------------|-------|
| (2) టెంక్చర్ క్యాంఫర్ కో | 3 దా. |
| వైనం ఇపికాకో | 1 దా. |
| స్పిరిట్ ఈతరు నైట్రస్ | 3 దా. |
| జలము | 8 జా. |

జలుబువలన గలుగు దగ్గుయందును, యితర విధములగు దగ్గులందును, కఫము వెలువడకపోయిన మెడల, యీమందును ప్రతి మూడులేక నాలుగుంటల కొకబెన్నుచొ॥ యియ్యవలయును. ఇంతకు మించిన ప్రతిసంవత్సరము వయస్సునకును మోతాదును సంవత్సరమున కొక ద్రాము చొ॥ హెచ్చింపవలయును.

- (3) హైరాయిన్ హైడ్రోక్లోర్ $\frac{1}{2}$ గ్రా.
జలము 10 షా.

ఒక్కొక్క ఔన్న చొ॥ దినమునకు మూడుసార్లు.

రొమ్మపడి సెము

(తీవ్రముగనుండు ప్రారంభస్థితియందు)

ఆంటిమోనీ టార్టరేట్	1 గ్రె.
పొటాష్ నైట్రేట్	2 గ్రా.
టింక్చర్ క్యాంఫర్ కో	4 గ్రా.
జలము	12 ఔ.

అరఁబొన్న చొ॥ 3 గంటల కొకసారి యియ్య
వలయును.

శీతకాలపు గజ్జి (Chilblains.)

(1) కార్బాలిక్ ఆసిడ్	1 గ్రా.
టింక్చర్ అయోడిన్	2 గ్రా.
ట్యానిక్ ఆసిడ్	2 గ్రా.
ఆముదము	4 ఔ.

వీని నన్నిటిని గలిపి పైన రాయవలయును.

(2) అమ్మోనియం క్లోరైడ్	4 గ్రా.
వినిగర్	2 ఔ.
జలము	6 ఔ.

వీని నన్నిటిని గలిపి పైన రాయవలయును.

(3) గుడ్డను పెప్పర్మింట్ ఆయిలులో దడిపి పైన వేయనగును.	
---	--

మలబంధము (Constipation.)

పల్వీస్ ఇపికాక్	1 గ్రె.
యక్టోస్క్రిప్టు కాస్కారా సాగ్రడా	3 గ్రె.
“ బెలడోనా	1 గ్రె.
“ నక్సువామికా	1 గ్రె.

మాత్రయగుటకు వీలైనంత యక్టోస్క్రిప్టు జస్ట్ ను గలుపవలయును. నీనినన్నిటిని గలిపి 6 మాత్రల యాజేసి దీర్ఘవ్యాపితమగు మలబంధ విషయములందు రాత్రి నిద్రించు ముందు 1 లేక 2 మాత్రలను సేవించవలయును.

అధికకాలము మంచము పట్టుటవలన గలుగు పుండ్లు. (Bedsore.)

(1) పటిక	2 గ్రా.
టింక్చర్ క్యాంఫర్ కో	1 ఔ.
ఒక కోడిగుడ్డు తెలుపుతో బాగుగా గలిపి పుండ్లకు రాయనగును.	

(2) పుండ్లు పడుటకు ముందు యెర్రగా నున్న విషయములందు ల్యానోలీన్ ను బాగుగా రుద్దిన యెడల పుండ్లు యేర్పడకుండును.

బ్రాంకోన్యూమోనియా (Bronchopneumonia.)

(1 సం॥ వయసుగల బిడ్డలయందు వచ్చు న్యూమోనియావలె నుండునట్టి జ్వరము. పొంగు మొదలగు వ్యాధుల పిమ్మట రానగును.)

అమ్మోనియా కార్బనస్	1 గ్రె.
లైకర్ అమ్మోనియా ఆసిటేటిస్	40 మి.
టింక్చర్ బెలడోనా	4 మి.
టింక్చర్ సిల్లా	2 మి.
సిరప్ టోలు	20 మి.
ఇన్ ఫ్యూజన్ సెనిగా	4 గ్రా.

నాల్గవవంతు చొ॥ 3 గంటల కొకసారి యియ్య వలయును.

కారిజముయొక్క క్షీణత

(సామాన్యముగ త్రాగుమోతులలో గలుగును)

(Cirrhosis of the Liver.)

అమ్మోనియం క్లోరైడ్	10 గ్రె.
టింక్చర్ జిన్నన్ కో	20 మి.
ఇన్ ఫ్యూజన్ సెన్నా	1 ఔ.

ఒక ఔన్ను చొ॥ దినమునకు రెండుసారు లియ్యవలయును.

పురుగుకాటు.

(నల్లులు, దోమలు, ఈగలు, మొదలగు పురుగుల వలన.)

చిట్టాముదమునుగాని వంట ఆముదమునుగాని రుద్దనగును.

 శూలనొప్పి (Colic.)

మెగ్నీషియం కార్బనస్	1½ ద్రా.
అమ్మోనియం కార్బనస్	½ ద్రా.
టింక్చర్ లావండువ్యాలా కొ	2 ద్రా.
పెప్పర్మింట్ ఆయిల్	2 మి.
జలము	6 ఔ.

నొప్పి తగ్గు వరకును రెండు గంటల కొకసారి అరఔన్ను చొ॥ యియ్యవలయును.

 మూత్రాశయ సంబంధమగు శూలనొప్పి.
(Renal Colic.)

టింక్చర్ బెలడోనా	10 మి.
ఆక్వా క్లోరోఫారం	1 ఔ.

మూడుగంటల కొకసారి ఒక ఔన్ను చొ॥ యియ్యవలయును.

కొలుకు వుండు. (Chancre.)

ఆరిస్టాల్	1 ద్రా.
బోరిక్ ఆసిడ్	1 ద్రా.

ఈ రెండును గలిపిన పొడిని వుండుపైన జల్ల వలయును.

కలరా (Cholera.)

(1) టింక్చర్ కాప్సికం	5 ద్రా.
స్పిరిట్స్ క్యాంఫర్	4 ద్రా.
టింక్చర్ గ్వయిషం	3 ద్రా.

వీనినన్నిటిని గలిపి రెండు లేక మూడు గంటలకు ఒకసారి ఒక ద్రాము కొలత ప్రకారం వేడి నీళ్లలో వేసి యియ్య వలయును.

(2) టింక్చర్ కాప్సికం	2 ద్రా.
టింక్చర్ ఓపియం	2 ద్రా.
టింక్చర్ రీమై కో	2 ద్రా.
పెప్పర్మింట్ ఆయిల్	2 ద్రా.
స్పిరిట్స్ క్యాంఫర్	2 ద్రా.

15 మొదలు 30 చుక్కల వరకును ప్రతి గంటకును యియ్యవలయును.

(3) రసభస్మము 1 గ్రె.

సోడా బై కార్బనేట్ 8 గ్రె.

దీనిని 4 భాగములుగా జేసి గంట కొక పొట్లము నియ్యవలయును.

(4) లైకర్ ప్రిక్సీన్ 15 మి.

టింక్చర్ డిజిటాలిస్ 40 మి.

ఆక్వా క్లోరోఫారం 6 ఔ.

కాళ్లును చేతులును చలువలు గ్రమ్ముట కారం భించినపుడు మూడు గంటల కొకసారి ఒక ఔన్ను చొ॥ నియ్యవలయును.

పసి బిడ్డలయందు కలరా (Cholera Infantum.)

(1) టింక్చర్ ఆకొనైట్ 4 మి.

జలము 4 ఔ.

అర ఔన్ను చొ॥ రెండుగంటల కొకసారి నియ్యవలయును.

(2) హైండ్రార్జరై కం గ్రేటా 1 గ్రె.

మూడు గంటల కొకసారి నియ్యవలయును.

కాళ్లు చేతులు స్వాధీనమునుండి తప్పి గంతులు
వేయుట. Chorea. (ప్రారంభగతియందు)

- (1) సోడా సాలిసైలెస్ 1 గ్రా.
స్పిరిట్స్ అమ్మోనియా ఆరోమేటిక్ 1½ గ్రా.
ఆక్వా క్లొరోఫారం 6 ఔ.
ఔన్ను చొ॥ దినమునకు మూడుసారులు.

(2) (అనంతర గతులయందు)

- లైకర్ ఆర్సెనికాలిస్ 3 మి.
ఆక్వా క్యాంఫర్ 1 ఔ.
1 ఔన్ను చొ॥ దినమునకు రెండుసారులు
భోజనానంతరము యియ్యవలయును.

క్రమముగా లైకర్ ఆర్సెనికాలిస్ మోతాదును
దినమునకు 15 మినిములకు హెచ్చింపవలయును.

- క్లోరల్ హైడ్రేట్ 2 గ్రె.
పొటాష్ బ్రొమైడ్ 8 గ్రె.
టింక్చర్ హాయసామి 10 మి.
చక్కెర (కొంచెముగా)
జలము 1 ఔ.

వణకుట అధికముగా నుండినపుడు యీమందు
ను యియ్యవలయును.

జీర్ణకారి (Carminative Mixture.)

స్పిరిట్స్ అమ్మోనియా ఆరోమేటిక్	3 ద్రా.
సోడా బై కార్బోనేట్	90 గ్రె.
టింక్చర్ కార్డమం కో	6 ద్రా.
స్పిరిట్స్ క్లోరోఫారం	3 ద్రా.
జలము	10½ ఔ.

బాగుగా కలుప వలెను. మూడుగంటల కొక ఔన్ను చొ॥ నీయవచ్చును.

అజీర్తికి ఉపయోగ మగును. బలమగు భోజనము పిమ్మట ఒక మోతాదు పుచ్చుకొన నగును. 4 లేక 5 చుక్కలు పెప్పర్మింట్ ఆయిల్ కలుప నగును.

త్రాగుడుయందు అభిలాషను మాన్పుటకు

(Drunkenness.)

టింక్చర్ నక్సువామికా	20 మి.
టింక్చర్ జిన్నన్ కో	2 ద్రా.
టింక్చర్ కలంబా	2 ద్రా.
జలము	4 ఔ.

1 ఔన్ను చొ॥ భోజనపూర్వము ఆకలి బుట్టిం చుటకు గాను యియ్యనగును.

త్రాగుబోతునకు గలుగు సంధిగుణము.

(Delirium Tremens.)

పోడా బ్రొమైడ్	45 గ్రె.
క్లోరల్ హైడ్రేట్	45 గ్రె.
టింక్చర్ హయోసామస్	45 మి.
నారింజ రసము	4 మి.
ఆక్వా క్లోరోఫారం	3 ఔ.

ఔన్ను చొ॥ దినమునకు మూడుసార్లు యియ్య నగును.

అతిమూత్రము మధుపదార్థముతో గూడినది.

(Diabetes Mellitus.)

(1) ఆసిడ్ ఆర్పినియన్	$\frac{1}{50}$ గ్రె.
కొడినా ఫాస్ఫస్	$\frac{1}{4}$ గ్రె.
అలూయిన్	$\frac{1}{2}$ గ్రె.
స్ట్రిక్మీన్ ఫాస్ఫస్	$\frac{1}{50}$ గ్రె.

ఈ పాళ్ల ప్రకారం ఒక్కొక్క మాత్రలో నుండు నట్లు యక్ష్మాక్తు జన్మనతో గలిపి మాత్రలుగా జేసి భోజనానంతరము ఒక్కొక్క మాత్ర చొ॥ దినము నకు రెండు మాత్రలను సేవించ వలయును.

(2) యక్ష్టాస్త్రిక్టు జాంబులీన్ లిక్విడ్ 1 ద్రా.
జలములో గలిపి దినమునకు రెండుసార్లు
పుచ్చుకొనవలయును.

(3) ఆసిడ్ ఫాస్ఫారిక్ డిల్యూట్ 15 మి.
దీనిని ఒక ఔన్ను జలములో గలిపి దాహము
నణచుటకు బుచ్చుకొనవలయును.

మధుపదార్థము లేకుండ వెలువడు అతిమూత్రము.
(Diabetes Insipidus.)

జింక్ వెలీరియేనస్ , 4 గ్రె.
పైమోతాదు ప్రకారం మాత్రలుగా జేసి
దినమునకు మూడుమాత్రల నియ్యవలయును.

అతివిరేచనములు. (Diarrhoea.)

(1) బిస్మత్ సబ్ నైట్రేట్ 30 గ్రె.
సలాల్ 15 గ్రె.
సోడా బై కార్బనెట్ 15 గ్రె.

3 భాగములుగా జేసి మోతాదున కొక్కొక
గొట్లము చొ॥ దినమునకు మూడుసార్లు నియ్య
వలయును.

- (2) పల్వీస్ ఇపికాక్ కొ 15 గ్రె.
 బిస్మత్ సాలిసైలెస్ 15 గ్రె.
 3 భాగములుగా జేసి మోతాదున కొక్కొక
 పొట్లము చొ॥ దినమునకు మూడుసారు నియ్య
 వలయును.

-
- 1 సం॥ వయసుగల బిడ్డకు అతివిరేచనములు.
 పల్వీస్ గ్రేటా ఆరోమేటిక్ 6 గ్రె.
 బిస్మత్ సేలిసైలెస్ 6 గ్రె.
 6 పొట్లములుగా జేసి 3 గంటల కొక పొట్లము
 నియ్యవలయును.

-
- 1 సం॥ వయసుగల బిడ్డకు ఆకుపచ్చ రంగు
 విరేచనములు. (Green Diarrhoea.)
 ఒక బౌన్సు జలములో 20 మినిముల ల్యాక్టిక్
 ఆసిడ్ను గలిపి మూడేసి గంటల కొకసారి ఒక
 ద్రాము చొ॥ నియ్యవలయును.

-
- 2 సం॥ ల వయసుగల బిడ్డకు అతివిరేచనములు.
 సలాల్ 3 గ్రె.
 బిస్మత్ కార్బనస్ 12 గ్రె.
 పల్వీస్ గ్రేటా ఆరోమేటిక్ 12 గ్రె.

మలబంధము.

(సంవత్సరములోపు వయసుగల బిడ్డలకు)

మెగ్నీసియం కార్బనస్	4 గ్రె.
మెగ్నీసియం సల్ఫేట్	16 గ్రె.
సోడా బై కార్బనస్	4 గ్రె.
పల్వీస్ రీమె	4 గ్రె.
టింక్చర్ కార్డమం కో	20 మి.
టింక్చర్ జింజిబ్రస్	8 మి.
ఆక్వా అసీతి	4 ద్రా.

1 ద్రాము మోతాదు చొ॥ దినమునకు రెండు సారు లియ్యవలయును.

చిన్న బిడ్డగుణము (Convulsions.)

(1 సం॥ వయసుగల బిడ్డకు)

పోటాస్ బ్రొమైడ్	4 గ్రె.
టింక్చర్ బెలడోనా	4 మి.
క్లోరల్ హైడ్రేట్	2 గ్రె.
ఆక్వా క్లోరోఫారం	4 ద్రా.

1 ద్రాము చొ॥ మూడు గంటల కొకసారి లియ్యవలయును. చక్కెర కొంచెముగా చేర్చుము.

విరేచనకారులు.

- (1) చిట్లాముదము 2 లేక 3 ద్రాములు క్షేమకరమగు విరేచనకారిగ సేవింపనగును. ఒక గ్లాసు నకు లోపల నిమ్మరసమును రాసి, ఆముదమును పోసి, పైన కొంచెముగా నిమ్మరసమును బోసి, అటుపిమ్మట నీయాముదమును ద్రాగుట వలన నీ సువాసనచే నందలి అసహ్యమును అరుచియును తగ్గును.
-

- | | |
|----------------------|---------|
| (2) టార్టారిక్ ఆసిడ్ | 1 ద్రా. |
| సోడా కార్బనస్ | 1 ద్రా. |
| క్రీం ఆఫ్ టార్టార్ | 1 ద్రా. |
| మెగ్నీసియం సిట్రస్ | 1 ద్రా. |
| మెగ్నీసియం సల్ఫేట్ | 1 ద్రా. |
| చక్కెర (మెత్తనిపొడి) | 2 ద్రా. |

ఒక టీ స్పూన్ కొత్తనుగాని కొంచె మెక్కువగాగాని నీటిలోగలిపి పుచ్చుకొనవలయును. ఇది “ఈనోజ్ ఫ్రుట్ సాల్ట్” వలె సాధు విరేచనకారిగ బనిచేయును.

(3) మైద్రాబాద్ కం క్రేటా $\frac{1}{2}$ గ్రె.
 (గ్రే పాడరు) మొదలు 2 గ్రె.
 సోడా కార్బనేట్ 6 గ్రె.

బిడ్డలకు నీళ్ళవిరేచనము లగుచు, విరేచనము
 తెల్లగా కుదపలుగానుండి, పాలు అజీర్ణస్థితిలో
 వెలువడుచుండిన యెడల, యీమందు వెంటనే పని
 చేయును. ఉదయమున ఒక పొట్లమును సాయం
 త్రమ ఒక పొట్లమును యియ్యనగును. 1 మొదలు
 6 నెలలు వయసుగల బిడ్డకు అరగ్రెయిను గ్రే
 పాడరు, 6 గ్రె. సోడా ; 6 మొదలు 12 నెలల
 వరకు 1 గ్రె. గ్రేపాడరును 6 గ్రె. సోడా ; 1 సం॥
 మొదలు 3 సం॥ ల వరకును $1\frac{1}{2}$ గ్రె. గ్రేపాడరు
 6 గ్రె. సోడా ; 4 మొ. 8 సం॥ ల వయసు వర
 కును 3 గ్రె. గ్రేపాడరును 6 గ్రె. సోడాయును ;
 యీమోతాదుల ప్రకారము యియ్యవలయును.

1) సోడా సల్ఫేట్ 4 గ్రా.
 టింక్చర్ ఆఫ్ జింజర్ 20 మి.
 జలము 2 ఔ.

సామాన్యముగ విరేచనమగుటకు, దీనిని ఉప
 యోగింప వచ్చును. శరీర తత్వమును బట్టి సోడా.

సల్ఫేట్ అధికముగ దోచిన యెడల ఒకటి రెండు
ద్రాములు తగ్గింపవచ్చును.

(5) సోడా సల్ఫేట్	4 ద్రా.
టింక్చర్ సింకోనా	4 ద్రా.
సల్ఫేట్ ఆఫ్ ఐరన్	15 గ్రె.
జలము	8 ఔ.

బాగుగ కలిపి నాలుగు గంటల కొకసారి ఒక
ఔన్ను పుచ్చుకొనవచ్చును. స్త్రీహ వ్యాధులయం
దును, ఋతుస్రావము యొక్క నిలుపుదల యందు
ను, నులిపురుగులకును ఉపయోగింప నగును.

(6) మెగ్నీషియా బై కార్బనస్	10 గ్రె.
సోడా బై కార్బనస్	8 గ్రె.
మిస్టూరా సెన్నా కొ	1 ఔ.

బాగుగా కలుపవలెను. ఆజీర్తికిని కారిజ వ్యాధ
లకును ఉపయోగింప నగును.

(7) రసభస్మము	5 గ్రె.
పల్వీస్ జాలప్ కొ	1 ద్రా.

బాగుగా కలిపి పవుడరుగా చేయవలయును. బలమగు విరేచనకారి. మలము నీటితో గూడి యుండునట్లు చేయును. నంజు వ్యాధుల యందు ఉపయోగింప నగును.

(8) పొడాఫైలం రెజిన్	1½ గ్రె.
యక్ష్మాక్టు కాలొసింత్ కొ	30 గ్రె.
పల్విస్ ఇపికాక్	4 గ్రె.

కొంచెము జిగురుతో బాగుగా కలిపి 12 మాత్రలుగా జేయ వలయును. మోతాదు—రెండు దినముల కొకమాత్ర చొ॥ కారిజ వ్యాధులకును, విరేచన బద్ధమునకును ఉపయోగింప నగును.

జలుబు (Coryza.)

(ప్రారంభస్థితియందు)

టింక్చర్ ఆకొనైట్	4 మి.
టింక్చర్ బెలడోనా	8 మి.
స్పిరిట్స్ క్యాంఫర్	8 మి.
ఆక్వా క్లోరోఫారం	2 ఔ.

అర ఔన్ను చొ॥ మూడు గంటల కొకసారి యియ్యవలయును.

2 సం॥ ల వయసుగలబిడ్డకు అతివిరేచనములు.

సలాల్ 3 గ్రె.

బిస్మత్ కార్బనస్ 12 గ్రె.

పల్వీన్ కేట్రా ఆరోమేటిక్ 12 గ్రె.

ఆరు మోతాదులుగ జేసి మూడేసి గంటల
కొక మోతాదు నియ్యవలయును.

ఋతుస్రావమునం దధికముగనగుట, లేక తఱచుగ
నగుట, లేక అధికకాలము వఱకు నగుట

(Menorrhagia.)

(1) యక్ష్టాన్తిష్ఠ యెగ్గోటా లిక్విడ్ అరద్రాము మొద
లు ఒక ద్రాము వరకును జలములోగాని షర
బతులోగాని కలిపి మూడుగంటల కొకసారి
యియ్యవలయును.

(2) టింక్చర్ హమామలిస్ 5 చుక్కలను మూడు
లేక నాలుగు గంటల కొకసారి జలములో గలిపి
యియ్యవలయును.

(3) ఋతుస్రావము అధికముగనగు విషయములో
ఒకటి లేక రెండునిమ్మకాయలరసమును నోటితో
బీల్చుటవలన మిగులగుణముగానుండునని యొక
అమెరికా వైద్యశాస్త్రజ్ఞుడు చెప్పుచున్నాడు.

అజీర్ణవ్యాధి (Dyspepsia.)

(1) బిస్మత్ కార్బనస్	30 గ్రె.
పెప్సిన్ వైన్	1½ ద్రా.
టింక్చర్ నక్సువామికా	24 మి.
పల్విస్ ట్రాగకాంత్	12 గ్రె.
ఆక్వా మెంతా పిప్	3 ఔ.
ఔన్ను చొ॥ దినమునకు మూడుసారు లియ్యవలయును.	

(2) సోడా బై కార్బనస్	45 గ్రె.
పల్విస్ రీయె	15 గ్రె.
మెగ్నీషియం కార్బనస్	15 గ్రె.
స్పిరిట్స్ క్లోరోఫారం	30 మి.
టింక్చర్ నక్సువామికా	15 మి.
ఆక్వా మెంతా పిప్	3 ఔ.

(3) లైకర్ బిస్మత్ యెట్ పెప్సిన్ కో (హూలెట్)	2 ద్రా.
ఆక్వా అనీతి	1 ద్రా.
జలము	3 ఔ.

1 ఔన్ను మోతాదులో దినమునకు మూడుసారు లియ్యవలయును.

ఋతుస్రావమునందు నొప్పి కలుగుట
(Dysmenorrhoea.)

లైకర్ కాలొఫైల్ యెట్ ఫల్ సేటిల్లా	40 మి.
లైకర్ సెడెన్స్ (పెర్రీ డేవిస్ కంపెనీ)	50 మి.
ఆలెట్రీన్ కార్డియల్	1 ద్రా.
ఆక్వా క్లోరోఫారం	2 ఔ.

ఒక ఔన్ను చొ॥ దినమునకు రెండుసారు లి న్యూ
వలయును.

చెవిపోటు (Earache.)

టింక్చర్ ఓపియం	1 ద్రా.
గ్లి సెరీన్	1½ ద్రా.
కార్బాలిక్ ఆసిడ్	24 మి.
కొబ్బరి నూనె	1 ఔ.

ఈమిశ్రితౌషధమును వెచ్చచేసి 1 లేక 2 చుక్కలను చెవిలో వేయవలయును.

మూగగజ్జి (Eczema.)

సాలిసైలిక్ ఆసిడ్	15 గ్రె.
జింక్ ఆక్సైడ్	40 గ్రె.
వాసలీన్	1 ఔ.

ఈ ఆయింటుమెంటును పైన రాయనగును.

దుర్వాయువులను క్రిమి జాలములను, నశింపజేయు
మందులు (Disinfectants.)

(1) కార్బాలిక్ ఆసిడ్ 1 ద్రా.
జలము 1 పైంటు.

కురుపులు పుండ్లు, గాయములు—కడుగుట
కు పయోగించును.

(2) బోరిక్ ఆసిడ్ 4 గ్రె.
జలము 1½ ద్రా.

నేత్రములకు, మూత్రాశయమునకు, భగ
రంధ్రమునకు, నోటికి—శుభ్రపరచుట కు పయో
గించును.

(3) క్రియోసోట్

ఒక పైంటు ఉడుకునీళ్లలో ఒక ద్రాము క్రియో
సోట్ను వేసి వాసన జూచినయెడల క్షయవ్యాధి
కుందు దగ్గును తెమడను తగ్గించును. 1 మొదలు
చుక్కలవరకును క్రియోసోట్ను కాడ్ లివరు
ఆయిల్ మోతాదులో గలిపి పుచ్చుకొనినయెడల
క్షయవ్యాధియందు గుణముగ నుండును.

4' పొటాస్ పర్మాంగనేట్. దీనిని నీటిలో గలిపినయెడల య్రరంగు యేర్పడును. ఒక ఔన్ను జలములో రెండు గ్రెయినుల పొటాస్ పర్మాంగనేట్ను గలిపి దుర్వాసనగల కురుపులను గడిగినయెడల నా దుర్వాసన నశించును.

ఋతుసావము నిలచిన విషయములో 2 లేక 3 గ్రెయినులు మాత్రగాజేసి దినమునకు 3 లేక 4 సారు లిచ్చినయెడల గుణ మియ్యగలదు.

(5) పర్క్లొరీడ్ ఆఫ్ మెర్క్యురీ.

ఇది క్రిమిజాలముల నశింపజేయుటయందు మిగుల బలమైనది. 10 ఔన్నుల జలములో 1 గ్రెయినునుగలిపి 'అంటువ్యాధిచే బాధనొందు రోగిని ముట్టుకొనినపిమ్మట చేతులు కడుగుకొనుట కుపయోగింపనగును.

(6) యూకలిప్టస్ ఆయిల్.

ఇది క్షయ వ్యాధియందును, దుర్వాసనతో గూడిన కఫము వెలువడు దగ్గు విషయములందును, మూత్రాశయము రేగుదలనందిన స్థితులయందును, 1 మొదలు 5 చుక్కలవరకును షరబతులో గలిపి యిచ్చినయెడల గుణమిచ్చునని యెంచబడుచున్నది.

(7) తైమాల్ (వాముపువ్వు)

చర్మవ్యాధులకు తైమాల్ తో చేయబడిన సబ్బు ఉపయోగింపనగును. 6 గ్రెయినుల తైమాల్ ను ఉడుకునీళ్లలో వేసి వాసన జూచినయెడల జలుబున కుపయోగించును. చర్మవ్యాధులకు 5 మొదలు 30 గ్రెయినులవరకు 1 బౌన్సు వాసలీన్ లో గలిపి ఆయింటుమెంటుగా జేసి ఉపయోగింపవచ్చును.

(8) మెంతాల్ (పెప్పర్మంట్ పువ్వు)

మెంతాల్ 3 భాగములు, క్లోరోఫారం 4 భాగములు, ఆలివ్ ఆయిల్ 16 భాగములు—వీనినన్నిటినిజేర్చిన తైలమును నడుమునొప్పి, తుంటినొప్పి, నరములతో సంబంధించిన తలనొప్పి, మొదలగువాని విషయములలో పైన రాయుటవలన నుపయోగించగలదు.

ఋతుస్రావము తెలుపువర్ణముగా నుండుట

(కుసుమవ్యాధి)

(Leucorrhoea.)

- (1) గోరువెచ్చని నీళ్లు బౌన్సునకు 2 గ్రె. చొ॥ జింక్ సల్ఫేటును గలిపి పిచికారీ చేయుటవలన నుపయోగముగ నుండును.

(2) ప్రావమువలన మంటగా నుండినయెడల ఒక
పైంటు జలములో అరబెన్సు సోడా కార్బ్
నేటును గలిపి పిచికారీచేయుటవలన మిగుల
శమనముగా నుండగలదు.

(3) ఫెర్రాయి యెట్ క్వీసీన్ సిట్రస్ 40 గ్రె.
జలము. 8 ఔ.

బాగుగా గలిపి మూడులేక నాలుగుగంటలకు
ఒక బెన్సు చొ॥ పుచ్చుకొనవలయును. ఈమందు
పుచ్చుకొనినపిమ్మట నోరు కడుగుకొనవలయును.
లోహసంబంధమగు బేషధములన్నియు విరేచన
మునకు నలుపురంగును పుట్టించును.

(4) అమ్మోనియం క్లోరైడ్ 10 గ్రె.
లైకర్ సింకోనా హైడ్రోబ్రోం 10 మి.
టింక్చర్ నక్సువామికా 10 మి.
లైకర్ ఆర్సెనికాలిస్ 4 మి.
ఇన్ ఫ్యూజన్ జన్నన్ కో 2 ఔ.

ఒక బెన్సు చొ॥ భోజనానంతరము దినమునకు
రెండుసారు లియ్యవలయును.

జిగటవిరేచనములు (Dysentery.)

- (1) మెగ్నీసియం సల్ఫేట్ 4 గ్రా.
 ఆసిడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ డిల్యూట్ 40 మి.
 ఆక్వా మెంతా పిప్ 4 ఔ.
 ఒక్కొక్క ఔన్ను చొ॥ జిగటలేకుండగ సాఫై న
 విరేచనమగువరకును యియ్యవలయును.

- (2) పల్విస్ ఇపికాక్ 1 గ్రా.
 ట్యానిక్ ఆసిడ్ $\frac{1}{2}$ గ్రా.
 15 మాత్రలుగా జేసి గంట కొక మాత్ర చొ॥
 యియ్యవలయును.

ముఖపార్శ్వము వంకరపోవుట

(పక్షవాత సంబంధమగు) Facial Paralysis.

- సోడా సాలిసైల 30 గ్రె.
 లైకర్ అమ్మోనియా ఆసికేటిన్ 6 గ్రా.
 స్పిరిట్ యీతర్ వైట్రస్ 45 మి.
 ఆక్వా క్యాంఫర్ 3 ఔ.
 ఒక్కొక్క ఔన్ను మోతాదు. చొ॥ దినమునకు
 మూడుసారు లియ్యవలయును.

పిత్తాశయ సంబంధమగు రాళ్లు. (Gall Stones.)
(కడుపునొప్పి లేనిసమయములో సేవించుటకు)

(1) సోడియం గ్లైకోకలేట్ 5 గ్రె.
భోజనానంతరము దినమునకు మూడు సార్లు
నియ్యవలయును.

(2) యక్టస్క్రిప్టు బెలడోనా 1 గ్రె.
పొడాఫయిలం రెజిన్ 1 గ్రె.
4 మాత్రలుగా జేసి దినమునకు మూడుమాత్రలు
నియ్యవలయును.

సన్ని పాతజ్వరమునందు పేగులలోనుండి
రక్తస్రావ మగుట

(Intestinal Haemorrhage in Enteric.)

ట్యానిక్ ఆసిడ్ 40 గ్రె.
లైకర్ మార్ఫియా హైడ్రోక్లోర్ 40 మి.
కర్పూర తైలము 20 మి.
గం ఆకేసియా 1 ఔ.
టింక్చర్ క్లోరోఫారం కొ 40 మి.
ఆక్వా మెంతా పిప్ 4 ఔ.

4 భాగములుగా జేసి 4 గంటల కొకసారి
నియ్యవలయును.

సన్నిపాత జ్వరము (Typhoid Fever.)

లైకర్ అమ్మోనియా సిక్రేటిస్	6 గ్రా.
సోడా క్లోరైడ్	15 గ్రె.
టింక్చర్ ఆరంటీ	1 గ్రా.
ఆక్వా అసీతి	3 ఔ.

ఒక్కొక్క ఔన్ను చొ॥ దినమునకు మూడుసారు లియ్యవలయును.

సన్నిపాత జ్వరమునందు ఉదరము వాయు పూరితమగుట (Tympanites in Enteric.)

రసభస్మము	1 గ్రె.
సోడా బైకార్బనెట్	30 గ్రె.

8 భాగములుగా జేసి 2 గంటల కొక పొట్లము నియ్యవలయును.

మూర్ఛ (Epilepsy.)

పోటాసియం బ్రొమైడ్	30 గ్రె.
సోడియం బ్రొమైడ్	30 గ్రె.
అమ్మోనియం బ్రొమైడ్	10 గ్రె.
లైకర్ ఆర్సెనికాలిస్	4 మి.
ఆక్వా క్లోరోఫారం	2 ఔ.

1 ఔన్ను చొ॥ దినమునకు రెండుసారు లియ్యవలెను.

సెగవ్యాధి (Gonorrhoea.)

(1) (ప్రథమగతియందు)

పోటాస్ బై కార్బనస్ 1 ద్రా.

పోటాస్ ఆసిటస్ 1 ద్రా.

టింక్చర్ ఆకొనైట్ 6 మి.

టింక్చర్ హయెసామి 2 ద్రా.

ఇన్ ఫ్యూజన్ బక్కు 6 ఔ.

ఒక ఔన్సు చొ॥ మూడు గంటల కొకసారి
లియ్యవలయును.

(2) (ద్వితీయగతియందు)

ఓలియం శాంటాల్ స్లేవి (చందినీనూనె) 30 మి.

ఓలియం క్యూబెబ్ 15 మి.

బాల్సం కోపేబా 30 మి.

లైకర్ పోటాస్ 30 మి.

స్పిరిట్ యీతర్ వైట్రస్ 1 ద్రా.

టింక్చర్ హయెసామి 45 మి.

ఇన్ ఫ్యూజన్ బక్కు 3 ఔ.

ఒక ఔన్సు చొ॥ దినమునకు మూడుసారు
లియ్యవలయును.

(లేక)

బొల్సం కొపేబా 30 మి.

పోటాన్ నైట్రస్ 15 గ్రె.

గం అకేసియా (అనసరమైనంత)

ఇన్ ఫ్యూజన్ బక్కు 3 ఔ.

ఒక ఔన్ను చొ॥ దినమునకు మూడుసార్లు
లియ్యవలయును.

(3) (తృతీయ గతియందు)

హెల్మిటాల్ 15 గ్రె.

మూడు భాగములుగా జేసి దినమునకు మూడు
సార్లు లియ్యవలయును.

(లేక)

కొపేబా, క్యూబెబ్, శాంటాల్ మాత్రలు
(పెర్రీడేవీస్ అండ్ కంపెనీవారివలన తయారు చేయ
బడినవి)

4 గంటల కొక మాత్ర చొ॥ లియ్యవలయును.

(4) ధీర్ఘ సెగవ్యాధికి పిచికారీ చేయుటకు.

జింక్ పర్మాంగనేట్ $\frac{1}{4}$ గ్రె.

జలము 1 ఔ.

గౌట్ అను వాతరోగము (Gout.)

అమ్మోనియా ఫాస్ఫస్	20 గ్రె.
అమ్మోనియా అయోడైడ్	4 గ్రె.
వైనం కాల్చికం	10 మి.
ఆక్వా క్లోరోఫారం	2 ఔ.

ఒక ఔన్ను చొ॥ దినమునకు రెండు సారు
లియ్యవలయును.

క్షయవ్యాధియందు శ్వాసకోశములనుండి రక్తము వెలువడుట (Haemoptysis.)

(1) మెగ్నీషియం సల్ఫేట్	2 గ్రా.
గ్యాలిక్ ఆసిడ్	15 గ్రె.
ఆసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ డిల్యూట్	45 మి.
టింక్చర్ కార్డమం కో	2 గ్రా.
ఆక్వా క్లోరోఫారం	3 ఔ.

ఒక ఔన్ను చొ॥ 4 గంటల కొకసారి యియ్య
వలయును.

(2) పిల్వూలా ప్లంబి కం ఓపియం 1 గ్రె.

1 గ్రె॥ మాత్ర చొ॥ దినమునకు రెండుసారు
లియ్యవలయును.

తలనొప్పి (Headache.)

- (1) ఫెనాసిటిన్ 5 గ్రె.
కెఫీన్ సిట్రస్ 3 గ్రె.

ఈ రెంటిని గలిపి ఒక మోతాదుగా నియ్యవలయును. తలనొప్పి నెమ్మది లేనియెడల 4 గంటల పిమ్మట మరెయ్యక పొట్లము నియ్యవలయును.

- (2) పొటాసియం బ్రామైడ్ 15 గ్రె.
టింక్చర్ జెల్స్మియం 5 మి.
కెఫీన్ సిట్రస్ 2 గ్రె.
సిరప్ ఆరంటీ 40 మి.
ఆక్వా క్లొరోఫారం 1 టే.

ఇదియంతయు నొకమోతాదుగా నియ్యవలెను. తలనొప్పి నెమ్మదిలేనియెడల 4 గంటలపిమ్మట మరెయ్యక మోతాదు నియ్యవలయును.

వెక్కిలి (Hiccough)

- (1) సాధుగతియందు లోనికి కొన్ని ధీర్ఘశ్వాసలను దీసికొని, సాధ్య మగునంతవరకు శ్వాసను నిలిపి యుంచుటవలన, నెమ్మదించి పోవును.

- (2) చల్లని నీటిని ద్రాగుటవలన నిలచిపోవచ్చును.

- [3] ఒకద్రాము స్పిరిట్స్ అమ్మోనియా ఆరోమేటిక్ ను ఒక ఔన్ను జలములో వేసి పుచ్చుకొనిన నయము కావచ్చును.
- [4] 10 గ్రెయినుల బిస్మత్ సబ్ నైట్రేట్ ను జలములో గలిపి పుచ్చుకొనిన యొకప్పుడు నయము కావచ్చును.
- [5] దీర్ఘ వ్యాపితమగు నీవ్యాధియందు, ఒక టీస్పూన్ ఆవాలను 4 ఔన్నుల మసలగాచిన నీళ్లలో 20 నిమిషముల కాలము పుంచి పిమ్మట వడపోసి త్రాగినచో వెంటనే వ్యాధిరహితమైనట్లు దెలియుచున్నది.

హిస్టేరియా (Hysteria.)

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) ఫెర్రు బ్రామైడ్ | 1 గ్రె. |
| జింక్ బ్రామైడ్ | $\frac{1}{2}$ గ్రె. |
| క్విసీన్ బ్రామైడ్ | 2 గ్రె. |
| పిల్కూలా ఆలోస్ యెట్ | |
| ఆసాఫటిడా | 4 గ్రె. |

వీనినన్నిటిని 2 మాత్రలుగా జేసి దినమునకు రెండుమాత్రలు చొ॥ సేవించవలయును.

(2) టింక్చర్ వెలీరియన్ అమ్మోనియేటా	1½ డ్రా.
స్పిరిట్ యీతరిస్ కో	1½ డ్రా.
టింక్చర్ అసాఫటిడా	45 మి.
ఆక్వా క్యాంఫర్	3 ఓ.

ఒక బౌన్సు మోతాదులో దినమునకు మూడు సార్లు లియ్యవలయును.

మూత్రవిసర్జనము స్వాధీనము తప్పుట (Incontinence of Urine.)

ఇది సామాన్యముగా బిడ్డలలో గలుగుచుండును. 4 చుక్కలు టింక్చర్ బెలడోనాను జలములో గలిపి సాయంకాలము 4 గంటలకు లియ్యవలయును. బిడ్డ పరుండబోవునపుడు మరల నడచే ప్రకారము లియ్యవలయును. ప్రతిదినమును మోతాదును ఒకచుక్క చొ॥ 10 చుక్కలవరకును గాఢింపవలయును. కొద్దిమోతాదువలనయే ఉపమోగముగనుండినయెడల మోతాదును హెచ్చింపనవసరము లేదు.

పశిరికెలు (లేక పచ్చకామాల (Jaundice.)

అమ్మోనియం క్లోరైడ్	45 గ్రె.
టింక్చర్ పొడాఫైలిన్ అమ్మోనియేటా	15 మి.
ఇన్ ఫ్యూజన్ జన్నన్ కో	3 ఔ.

ఒక ఔన్ను మోతాదు చొ॥ దినమునకు
మూడుసారు లియ్యవలయును.

చలిజ్వరము (Malaria.)

(1) క్వినీన్ సల్ఫేట్	15 గ్రె.
మెగ్నీసియం సల్ఫేట్	3 గ్రా.
అమ్మోనియం క్లోరైడ్	30 గ్రె.
ఆసిడ్ వైట్రో హైడ్రోక్లోర్ డిల్	30 మి.
ఆక్వా మెంతా పిప్	3 ఔ.

(2) క్వినీన్ సల్ఫేట్	15 గ్రె.
ఫెర్రయి సల్ఫేట్	3 గ్రె.
మెగ్నీసియం సల్ఫేట్	3 గ్రా.
ఆసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్ డిల్యూట్	30 మి.
ఆక్వా మెంతా పిప్	3 ఔ.

ఒక ఔన్ను మోతాదులొ దినమునకు మూడు
సారు లియ్యవలయును.

చలిజ్వరఫలితముగ బల్లపెరుగుట

(Enlargement of Spleen.)

ఆర్సెనిక్ అయొక్షైడ్	1 గ్రె.
క్విసీన్ హైడ్రోక్లోర్	48 గ్రె.
యక్టాస్క్రీప్టు నక్సువామికా	8 గ్రె.
యక్టాస్క్రీప్టు కాస్కారాస్కాగ్రాడా	16 గ్రె.
యక్టాస్క్రీప్టుజన్నన్ (మాత్రయగుటకు అవసరమైనంత)	

32 మాత్రలుగాజేసి ఒక్కొక్క మాత్ర చొ॥
దినమునకు మూడుసార్లు భోజనానంతర ముప
యోగింపనగును.

జ్వరఫలితమగు బల్లకు పైనరాయుటకు మందు.

1) అంగ్యుయెంటం హైడ్రార్జరై అయొక్షైడ్	
రూబి	4 గ్రా.
అంగ్యుయెంటం బెలడోనా	4 గ్రా.
స్త్రీహపైన రాయవలయును.	

(లేక)

2) క్రియసోట్	2 గ్రా.
లినిమెంట్ అయొడిన్	6 గ్రా.
స్త్రీహపైన ఒకచతురపు అంగుళముమేర రాయ వలయును.	

మెదడుయొక్క పొరలవాపుదల (వయస్కులలో)

Meningitis (In Adults.)

- (1) పొటాసియం బ్రొమైడ్ 45 గ్రె.
 పొటాసియం అయోడైడ్ 9 గ్రె.
 టింక్చర్ హయెసామి 45 మి.
 ఆక్వా క్లోరోఫారం 3 ఔ.
 ఒక ఔన్ను మోతాదులో దినమునకు మూడు
 సార్లు లియ్యవలయును.

- (2) హైడ్రార్జరై ఆక్సైడ్ స్లేవి ఆయింటుమెంటును
 అస్వస్థతభాగమున వెండ్రుకలను బూర్తిగా
 తొలగించి రుద్దవలయును.

మూత్రాశయమునందు రక్తముగూడి, మూత్ర
 మేర్పడుట నిలచిపోయి, ధాతునష్టము
 కలుగుచు, తీవ్రస్థితిని వహించుట

Acute Nephritis (Bright's Disease.)

- పొటాష్ ఆసిటస్ 45 గ్రె.
 లైకర్ అమ్మోనియా ఆసిటేటిస్ 6 గ్రా.
 స్పిరిట్ యాతర్ వైట్రస్ 45 మి.
 టింక్చర్ హయెసామి 45 మి.
 ఆక్వా క్యంఫర్ 3 ఔ.

1 ఔన్ను మోతాదులో దినమునకు 3 సార్లు.

నరములసంబంధమగు బలహీనత

(Nervous Debility.)

యక్ష్మాక్తు డామియానా లిక్విడ్	40 మి.
ఆసిడ్ ఫాస్ఫారిక్ డిల్యూట్	20 మి.
టింక్చర్ నక్సువామికా	10 మి.
ఇన్ ఫ్యూజన్ జస్ట్	2 ఔ.

ఒక ఔన్ను మోతాదులో దినమునకు రెండు సార్లు భోజనానంతర మియ్యవలయును.

క్షయవ్యాధియందు రాత్రి చెమటలు

(Night Sweats of Phthisis.)

జింక్ ఆక్సైడ్	8 గ్రె.
యక్ష్మాక్తు బెలడోనా	1 గ్రె.

నాలుగు మాత్రలుగా జేసి రాత్రి పరుండు ముందు ఒక మాత్ర చొ॥ సేవించవలయును.

గుండె అదరు (Palpitation.)

గొటాసియం బ్రొమైడ్	45 గ్రె.
సింక్చర్ డిజిటాలిస్	15 మి.
టింక్చర్ కనవలేరియా మజలిస్	30 మి.
అక్వా ఆనీతి	3 ఔ.

1 ఔన్ను మోతాదులో దినమునకు 3 సార్లు.

పేలు తలలో) (Lice.)

మర్కురీ పెర్క్లొరైడ్ 1 గ్రెయినును 10 ఔన్సుల
వినిగర్ లో గలిపి తలకు రాయవలయును.

గుండెనంజు (Pericarditis.)

(1) నొప్పి అధికముగా నుండిన విషయములలో
గుండెపైన బెలడోనా పలాస్ట్రీని సన్నని చర్మ
ముపైన యేర్పరచి పట్టువేయుట బాగుండును.

(2) పొటాస్ అసిటస్	45 గ్రె.
పొటాస్ అయొడ్డైడ్	9 గ్రె.
టింక్చర్ డిజిటాలిస్	15 మి.
ఆక్వా క్లోరోఫారం	3 ఔ.

ఒక ఔన్సు మోతాదులో 3 గంటల కొకసారి
యియ్యవలయును.

బిడ్డలయందు యెముకలలో పట్టు లేకుండుట

(Rickets.)

(1) మాల్టీన్ అండ్ కాడ్ లివరు ఆయిల్

(2) శనటాజెన్

ఈ మందులు సేవించువిధము ఆయా మందుల
సీసాలపై నుండును.

కోరింత దగ్గు (Whooping Cough.)

(2 సం॥ ల వయసుగల బిడ్డకు)

(1) అమ్మోనియం బ్రొమైడ్	6 గ్రె.
టింక్చర్ బెలడోనా	3 మి.
వైనం ఇపికాక్	9 మి.
జలము	6 ద్రా.

2 ద్రాముల మోతాదులో దినమునకు మూడు సార్లు లియ్యవలయును.

(2) 1 లేక 2 చుక్కలు యాకలిప్టస్ ఆయిల్ ను
2 ద్రాముల గోరువెచ్చని జలములో వేసి బాగు
గా కలిపి వెంటనే లియ్యవలయును.

(3) 1 సం॥ వయసుగల బిడ్డకు	
అయొడిన్ స్వచ్ఛమైనది	1 గ్రె.
పొటాసియం అయొడైడ్	15 గ్రె.
జలము	2 ఔ.

దీనిని 24 భాగములుగా జేసి ఒక్కొక్క భాగము
ను దినమునకు మూడుసార్లు లియ్యవలయును. ఇది
బాగుగా పనిచేయగలదు.

(4) దగ్గు యొక్క తెర దీర్ఘముగా నుండినయెడల

సోడియం బ్రొమైడ్	6 గ్రె.
క్లోరల్ హైడ్రేట్	3 గ్రె.
సిరప్	30 మి.
జలము	6 ద్రా.

2 ద్రాముల మోతాదులో దినమునకు మూడు సార్లు లియ్యవలయును.

క్షయవ్యాధి (Consumption.)

(1) గ్వయిషల్ కార్బనస్	6 గ్రె.
తియొకాల్	6 గ్రె.
క్రియసోట్	1½ గ్రె.
క్విన్సీన్ మ్యూరియస్	1½ గ్రె.
మూడు మాత్రలుగాజేసి దినమునకు మూడు మాత్రలు చొ॥ సేవింపవలయును.	

(2) క్రిం ఆఫ్ మాల్ట్ అండ్ కాడ్ లివరు ఆయిల్
విత్ క్రియసోట్ అండ్ హైపోఫాస్ఫేట్స్
(ఆపెన్ హెమిల్ అండ్ కో)

1 ద్రాము మోతాదులో దినమునకు మూడు సార్లు లియ్యవలయును.

న్యూమోనియా (Pneumonia.)

(ప్రథమగతి యందు)

(1) అమ్మోనియా కార్బనస్	12 గ్రె.
తైకర్ అమ్మోనియా సిక్రేటిస్	4½ ద్రా.
టింక్చర్ డిజిటాలిస్	15 మి.
ఆక్వా క్లోరోఫారం	3 ఔ.

ఒక ఔన్ను మోతాదు చొ॥ 4 గంటల కొక సారి యియ్యవలయును.

(తేక)

(2) టింక్చర్ ఆకొనైట్	4 మి.
వైనం ఆంటిమోనియాలిస్	16 మి.
స్పిరిట్స్ అమ్మోనియా ఆరోమేటిక్	1½ ద్రా.
ఇన్ ఫ్యూజన్ డిజిటాలిస్	4 ద్రా.
ఆక్వా క్లోరోఫారం	4 ఔ.

ఒక ఔన్ను మోతాదులో మూడుగంటల కొక సారి యియ్యవలయును.

(ద్వితీయగతి యందు)

దగ్గు తగ్గి కఫము అంతరించుచున్న సమయములో:—

సోడా అయొడైడ్	6 గ్రె.
అమ్మోనియా కార్బనస్	12 గ్రె.
వైనం యిపికాక్	30 మి.
టింక్చర్ సింకోనా	30 మి.
స్పిరిట్స్ క్లోరోఫారం	45 మి.
ఇన్ ఫ్యూజన్ సెనిగా	3 ఔ.

ఒక ఔన్ను మోతాదులో నాలుగుగంటల కొకసారి యియ్యవలయును.

(న్యూమోనియా యొక్క సందిగ్ధ స్థితియందు)

(During Crisis.)

లై కర్ప్రిక్ సీన్ హైడ్రాక్లోర్	15 మి.
టింక్చర్ కార్డమం కో	1½ ద్రా.
స్పిరిట్స్ క్లోరోఫారం	30 మి.
ఆక్వా అనీతి	3 ద్రా.

ఒక ద్రాము మోతాదులో 4 గంటల కొకసారి యియ్యవలయును.

కీళ్ల నొప్పి (Acute Rheumatism.)

(తీవ్రస్థితియందు)

(1) అమ్మోనియా ఫాస్ఫస్	30 గ్రె.
అమ్మోనియా సాలిసైలెస్	30 గ్రె.
ఆక్వా క్లోరోఫారం	3 ఔ.

ఔన్ను మోతాదులో దినమునకు మూడుసారు లియ్యవలయును.

(2) సోడా సాలిసైలిన్	30 గ్రె.
పొటాష్ బైకార్బనెట్	30 గ్రె.
స్పిరిట్స్ అమ్మోనియా ఆరోమేటిక్	45 గ్రె.
ఆక్వా క్యాంఫర్	3 ఔ.
ఔన్ను మోతాదులో దినమునకు మూడు సారు లియ్యవలయును.	

(వైన రాయుటకు)

(1) లినిమెంట్ బెలడోనా	1½ ద్రా.
లినిమెంట్ ఓపియం	1½ ద్రా.
లినిమెంట్ మెంతాల్	1½ ద్రా.
లినిమెంట్ క్లోరోఫారం	1½ ద్రా.
ఓలియం సినేపిస్	1 ఔ.

వీనినన్ని టీని మిశ్రితముజేసి అస్వస్థతభాగమునకు వైన రాయవలయును.

(2) ఆసిడ్ సాలిసైలిక్	1 ఔ.
టర్పెన్ టీన్	1 ఔ.
లానొలీన్	3 ఔ.
పారఫిన్ ఆయింట్ మెంట్	5 ఔ.

ఈ మందునైనను పైనరాయుట కుపయోగించవచ్చును.

దీర్ఘవ్యాపితమగు కీళ్లనొప్పి

(Chronic Rheumatism)

పోటాసియం అయోడైడ్	15 గ్రె.
టింక్చర్ గ్వయకై అమ్మోనియేటా	45 మి.
ఇన్ ఫ్యూజన్ సార్సా	3 ఔ.

ఒక ఔన్ను మోతాదులో దినమునకు మూడు సార్లు లియ్యవలయును.

గొంతునొప్పి (Sore Throat.)

పోటాస్ క్లోరైడ్	15 గ్రె.
గైకొ త్రై మొలైన్	1 గ్రా.
ఆక్వా క్లోరోఫారం	3 ఔ.

ఒక ఔన్ను మోతాదు చొ॥ 3 గంటల కొక సారి లియ్యవలయును.

1 సం॥ వయసుగల బిడ్డకు పండ్లు వచ్చునపుడు
గలుగు కలత

(Restlessness during Teething for
1 year old Child.)

పొటాసియం బ్రొమైడ్	6 గ్రె.
టింక్చర్ హయోసామి	20 గ్రె.
స్పిరిట్స్ క్లోరోఫారం	4 మి.
ఆక్వా అసీతి	4 ద్రా.

ఒక ద్రాము మోతాదులో 3 గంటల కొకసారి
యియ్యవలయును.

చిడుము లేక గజ్జి (Itches.)

(1) సల్ఫర్ సబ్లిమేటం	1 ద్రా.
బాల్సం పెరువియాని	$\frac{1}{2}$ ద్రా.
లానోలీన్	1 ఔ.

వీని నన్నిటిని గలిపి గజ్జిపై న రాయనగును.

2) బీటా నాస్టాల్	40 గ్రె.
సల్ఫర్ ఆయింట్ మెంట్	$\frac{1}{2}$ ద్రా.
వాసలీన్	1 ఔ.

వీనిని గలిపి కూడ గజ్జిపై రాయుట కుపయో
గింపనగును.

గొంతునొప్పికి గంధూషము.

(Gargle for Sorethroat.)

ఆలం (పటిక)	10 గ్రె.
బొరాక్సు (వెలిగారము)	10 గ్రె.
పోటాస్ క్లోరైడ్	10 గ్రె.
టింక్చర్ మిర్	15 మి.
జలము	1 జె.

గొంతు బొంగుపోవుట.

అతిమధురము వేళ్లయొక్క పొడి	4 ద్రా.
బాల్సం కొపేబా	3 ద్రా.
తేనె మైనము (తెల్లనిది)	2 ద్రా.

3 గ్రెయినుల మాత్రలుగా జేసి దినమునకు రెండు లేక మూడు మాత్రలుపయోగించవలయును.

మశూచి (Small Pox.)

2 ద్రాముల వినిగర్ను, జలములో గలిపి గాఢ కలుపకుండగగాని, ఉదయమును సాయంత్రమును పుచ్చుకొను చుండిన యెడల, మశూచి వ్యాపించిన స్థలములందు ఆ వ్యాధి కలుగ కుండ జేయవచ్చునని తెలియుచున్నది.

ఆహ్వానించుటకు లవణములు.

(Smelling Salts,)

అమ్మోనియా కార్బనస్	1 ఔ.
త్రై కల్ అమ్మోనియా ఫార్ట్	15 మి.
బెర్గ మాట్ ఆయిల్	10 మి.
యుడికొలోన్	30 మి.

• వీని నన్నిటిని గలిపి గాజుమూతగల బుడ్డిలో వేసి నిలవయుంచవలెను.

కొఱుకు వ్యాధి (Syphilis.)

(ప్రథమగతి యందు)

హైడ్రార్జరై కం క్రేటా (క్రే పవుడరు)	1 గ్రె.
--	---------

1 గ్రెయిను మోతాదులో దినమునకు రెండు సారు లియ్యవలయును.

(లేక)

త్రై కల్ హైడ్రార్జరై పెక్క్లోర్	1½ గ్రా.
ఆక్వా క్లోరోఫారం	1½ ఔ.

అరబ్బేన్సు మోతాదులో దినమునకు మూడు సారు లియ్యవలయును.

(ద్వితీయగతి యందు)

గ్రే పవుడరు	4 గ్రె.
పల్వీస్ ఇపికాక్ కో	4 గ్రె.
యట్స్సోక్కు జన్వన్ (వలసినంత)	
4 మాత్రలుగా జేసి దినమునకు 4 మాత్రల	
చొ॥ సేవించవలయును.	

(తృతీయగతి యందు)

పోటాస్ అయోడైడ్	10 గ్రె.
డనవన్స్ సాల్యూషన్	20 మి.
సిరప్ ట్రిపోలియే కో	
(పెర్రీ డేవిస్ కంపెనీది)	1 డ్రా.
జలము	2 ఔ.

ఒక ఔన్ను మోతాదులో దినమునకు రెండు సార్లు భోజనానంతర మియ్యవలయును.

ఎలుకలు (Rats.)

ఎలుకలబాధ విశేషముగా నున్నచోట పిప్పి ర్మెంట్ పువ్వు యొక్క పలుకులను ఎలుకలు సంచరించు స్థానములయందు చల్లినయెడల నవి పారిపోవును.

తలవెండ్రుకల వృద్ధికి (Hair Restorer.)

టింక్చర్ కెంతారిడిన్	4 ద్రా.
లైకర్ అమ్మోనియా ఫాక్ట్	2 ద్రా.
గ్లిసరీన్	4 ద్రా.
జలము	6 ఔ.

తలవెండ్రుకల కుదుళ్ళలో రుద్దుట కుపయోగింపవలయును.

గర్భిణీయందు వాంతులు

(Vomitting of Pregnancy.)

(1) ఇన్ స్ట్లూవిన్ 5 గ్రెయినుల మోతాదులో దినమునకు మూడుసారు లియ్యవలయును.

(2) వైనం ఇపికాక్ 5 మి.
జలము 10 ద్రా.

2 ద్రాముల మోతాదులో రెండు గంటల కొకసారి లియ్యవలయును.

(3) టింక్చర్ అయొడిన్ 4 మి.
జలము 1 ఔ.

2 ద్రాముల మోతాదులో 3 గంటల కొకసారి లియ్యవలయును.

ఒడలు దురదలు (Itching.)

- | | |
|------------------------|---------|
| (1) సోడియం హైపోసల్ఫైట్ | 4 ద్రా. |
| గ్లిసరీన్ | 2 ద్రా. |
| జలము | 4 ఔ. |

ఒడలున కంతకును రాసి ఒక అరగంట తరువాత శుభ్రముగా స్నానము చేయవలయును.

- (2) సుమారు 30 గాలనుల వేడినీళ్లలో 1 ఔన్సు వెలి గారపు పోడియును ఒక ఔన్సు సోడా బై కార్బ్ నేటును గలిపి స్నానము చేయవలయును.

- | | |
|----------------------|---------|
| (3) కార్బాలిక్ ఆసిడ్ | 2 ద్రా. |
| గ్లిసరీన్ | 1 ద్రా. |
| పన్నీరు | 8 ఔ. |

స్పంజిని యిందులో ముంచి ఒడలున కద్దవలయును.

పంటినొప్పి (Toothache.)

యాలకు అరఖును లింట్సులో ముంచి పంటిరంధ్రములో నుంచవలయును.

గొంతుయొక్క రేగుదలయందు గొంతులో

రాయుటకు (Throat Paint.)

ట్యానిక్ ఆసిడ్	30 గ్రా.
ఫాటాస్ క్లోరైడ్	10 గ్రా.
గ్లిసరీన్	1 ఔ.

శరీరమునం దచ్చటచ్చటగాని లేక గొంతుభాగమునందుగాని కంతు లేర్పడుట (Scrofula.)

- (1) సిరప్ ఫెర్రయి అయోడైడ్ ఒకద్రాము మూతాదును ఒకఔన్ను జలములో గలిపి భోజనానంతరము దినమునకు రెండుసారు లియ్యవలయును.
- (2) పైమందుతో పాటు మాల్ట్ చేరిన కాడ్లివరు ఆయిల్ ను గూడ పైప్రకారమే యియ్యవలెను.

పండ్లపొడి (Tooth Powder.)

కార్బిక్ ఆసిడ్	40 గ్రా.
ఫాటాస్ క్లోరైడ్	30 గ్రా.
రెజిన్ గ్వయాక్	20 గ్రా.
సీమసున్నపు పొడి	1 ద్రా.
మెగ్నీసియం కార్బనెట్	5½ ద్రా.

వీని నన్నిటిని గలిపి బాగుగా నూరవలయును.

జ్వరమునకు మందు (Fever Mixture.)

పోటాష్ సిట్రస్	1 ద్రా.
స్పిరిట్ యితర్ వైట్రస్	5 ద్రా.
నిమ్మ వరబతు	5 ద్రా.
లైకర్ అమ్మోనియా ఆసి టేటిస్	2 ఔ.

ఒకద్రాము మోతాదులో మూడుసంవత్సరముల వయసుగల బిడ్డకు రెండుగంటల కొనసారి నియ్యవలయును. పెద్దవారికి సంవత్సరమునకు 10 చుక్కలు చొ॥ మోతాదు హెచ్చించవలయును. వయస్కులకు 5 ద్రాముల మోతాదులో నియ్యవగును.

గుండ వ్యాధి (Heart Disease.)

మూడే ముఖ్య సూత్రములు.

- (1) అలసట కలుగకుండ శరీర పరిశ్రమ చేయవలయును.
- (2) ఉద్రేకమును బుట్టింపకుండ బలమును గలుగజేయు పదార్థముల భుజింపవలయును.
- (3) శాంతతతో గూడిన ఉల్లాసమును వహింపవలయును.

మూలశంక (Piles.)

(1) యక్షాస్త్రిక్టు హమామలిన్	2 ఔ.
యక్షాస్త్రిక్టు హైడ్రాస్టిన్	
కెనాడెన్సిన్	2 ఔ.
టింక్చర్ బెంజాయిన్ కో	2 ఔ.
టింక్చర్ బెలడోనా	4 ద్రా.
ఆలివ్ ఆయిల్	4 ఔ.
కార్బాలిక్ ఆసిడ్	1 ద్రా.
ఆసనస్థానమున రాయవలయును.	
(2) బెలడోనా ఆయింట్ మెంట్	2 ఔ.
హారతి కర్పూరము	1 ద్రా.
టింక్చర్ క్యాంఫర్ కో	1 ద్రా.

విశేష బాధతోగూడిన మూలశంక వ్యాధియందెది ఉపయోగముగ నుండగలదు. (పైనరాయుటకు మాత్రమే)

(3) ఈవ్యాధిచే బాధనెందువారు సాధు విగేచన కారుల నుపయోగించుచు మలబద్ధము లేకుండ జేసికొనవలయును.

నులిపురుగులు (Thread Worms.)

బిడ్డలకు 1 మొదలు 3 గ్రెయినులవరకు శాంటో
నీనును కొంచెము చక్కెరతోగలిపి రాత్రి పరుండ
బోవువేళ గుచ్చి ఉదయమున ఒక మోతాదు
చిట్లాముదము నియ్యవలయును.

పెద్దవారలకు యిదేరీటిగ రెట్టింపు మోతా
దులో నియ్యవలయును.

ఏటికపాములు (Round Worms.)

(బిడ్డలకు)

సాంటోనీన్	1 గ్రె. మొదలు 3 గ్రె. వరకు
రసభస్మము	$\frac{1}{2}$ గ్రె. మొదలు $1\frac{1}{2}$ గ్రె. వరకు

వలసినంత చక్కెర.

దీనినన్నిటిని గలిపి రాత్రి పరుండబోవు ముంద
సేవించి ఉదయముననే ఒక మోతాదు చిట్లాము
దము నియ్యవలయును.

పెద్దవారలకు దీనికి రెట్టింపు మోతాదును యిదే
ప్రకారము నియ్యవలయును.

తామర (Ringworm.)

- (1) తామర భాగమును సబ్బుతో గడిగి యీక్రింది మిశ్రితౌషధమును పైన రాయవలయును.

అయొడిన్ 10 గ్రె.

కర్పూర తైలము 1 ఔ.

- (2) సోడియం హైపోసల్ఫైట్ 1 ద్రామును 1 ఔన్సు జలములో గలిపి లేపనము చేయవలయును.

(3) క్రిస్టానిక్ ఆసిడ్ 1 ద్రా.

వాసలీన్ 10 ద్రా.

దీనిని పైన రాసిన నుపయోగించ గలదు.

(4) రసభస్మము 1 ద్రా.

టింక్చర్ అయొడిన్ 1 ఔ.

దీనిని అస్వస్థత భాగమున బ్రష్తో రాయవలయును.

(5) బోరిక్ ఆసిడ్ 1 ద్రా.

జలము 8 ఔ.

దీనిని విరివిగా రాయవచ్చును.

పొంగువచ్చు ద్రవపదార్థములు

(Effervescent Mixtures.)

(1) 20 గ్రెయినుల పొటాష్ బై కార్బనేటును రెండు ఔన్సుల జలమునందుగలిపి, లోనకు పుచ్చుకొను ముందు 14 గ్రెయినుల సిట్రిక్ ఆసిడ్ ను కలుపవలయును (కడుపు ఉబ్బరమునకు).

(2) 17 గ్రెయినుల సోడా బై కార్బనేటును రెండు ఔన్సుల జలమునందు గలిపి పిమ్మట 10 గ్రెయినుల సిట్రిక్ ఆసిడ్ ను గలిపి పుచ్చుకొనవలయును. (కడుపు ఉబ్బరమునకు).

(3) 2 ద్రాముల సోడా బై కార్బనేట్ ను 8 ఔన్సుల జలములో గలిపి ఒకబుడ్డిలో నుంచవలయును. 1 ద్రాము టార్టారిక్ ఆసిడ్ ను 4 ఔన్సుల జలములో గలిపి వేరుబుడ్డిలో నుంచవలయును. 4 ద్రాముల సోడా మిక్స్చరును 2 ద్రాముల ఆసిడ్ మిక్స్చరుతో గలిపి పుచ్చుకొనవలయును. జ్వరమునకును, గర్భవతులకు వాంతులగునపుడును, యియ్యనగును.

లైం వాటరు (Lime Water.)

శుభ్రమైన రెండు పైంట్ల చల్లనినీళ్లలో ఒక అర ఔన్సు కాల్షియార్చినసున్న మునుగలిపి మూడు గంటల కాలము దానిని నిలువ చేయవలయును. లోనకు గాలి చొరకుండు నట్లు మూతను జాగ్రతగా నుంచవలయును. దీనిని ప్రతి రెండు దినములకును క్రొత్తగా జేసికొనుట మంచిది. మోతాదు ఒక ఔన్సు మొదలుకొని మూడు ఔన్సుల వరకును యియనగును. పిల్లలకు పండ్లు నచ్చు నపుడును, విరేచనము లగు నపుడును, అజీర్తికిని, కలరాకును ఉపయోగింప నగును.

ఆల్టరేటివులు (Alteratives.)

రక్తము యొక్క స్థితిని మార్చునట్టి గాని, శరీరమునందు కొన్ని ద్రవముల స్రవింపజేయు, మూత్రగ్రంథుల యొక్క, కారిజము యొక్క, ప్రేగుల యొక్క, గతులను మార్చునట్టి గాని, మందులకు ఆల్టరేటివులని పేరు.

పోటాసియం బ్రొమైడ్

జలము

1 డ్రా.

6 ఔ.

బాగుగా కలిపిన పిమ్మట దినమునకు 3 పర్యాయములు ఒక్కొక్క ఔన్ను చొప్పున నీయవలయును. నరములు, మెదడుతో, సంబంధించిన వ్యాధుల కీయనగును.

(2) పొటాసియం బ్రొమైడ్	30 గ్రె.
స్పిరిట్ ఈతర్ నైట్రస్	30 మి.
తెల్లని చక్కెర	1 ద్రా.
జలము	1½ ఔ.

బాగుగా కలిపి, ఒకటి రెండు సంవత్సరముల నయను గల బిడ్డకు రెండు గంటల కొకసారి ఒక ద్రాము చొప్పున నీయవలయును. రెండు సంవత్సరముల పిమ్మట రెండు ద్రాములు యీయవచ్చును. పసిపిల్లలకు జ్వరము పైన మగతగలిగి నప్పుడీయవలయును. దీనికే చంటిబిడ్డగుణ మని వాడుక గలదు.

(3) పొటాసియం అయోడైడ్	1 ద్రా.
జలము	8 ఔ.

బాగుగా కలిపిన పిమ్మట, దినమునకు మూడు సార్లు ఒక్కొక్క ఔన్ను చొప్పున నీయవలయును. కొఱుకు వ్యాధి కుపయోగింపనగును.

(4) పెగ్నీ సియా బై కాప్సనస్	15 గ్రా.
ఆయిల్ ఆఫ్ అనిసీడ్	2 మి.
జలము	1½ ఔ.

ఆరుమాసములు మొదలు ఒక సంవత్సరము వరకు వయసుగల బిడ్డకు, కడుపు ఉబ్బరముగా నుండినపుడు ఒక ద్రాము యియ్యవలయును. ఆరుమాసముల లోపు వయసుగల బిడ్డకు అర ద్రాము యియ్యవలయును.

అస్టింగెంట్లు (Astringents.)

దేహమునందలి నానాభాగములయందు పని చేయుటవలన వివిధ అవయవములనుండి వెలునఁగు ద్రవపదార్థ పరిమాణములను తగ్గించు ఔషధములు అస్టింగెంట్లు అనబడును. రక్తము స్రవించు నపుడు ఆయాస్థానములయం దివి ప్రయోగింపబడిన యెడల చిన్న రక్తనాళములయొక్క మూతులు ముడుచుకొన జేయబడి రక్తస్రావము నిలుపు చేయబడును.

(1) ఆలం (పటిక) పొడి	1 ద్రా.
జలము	8 ఔ.

నాలుగుగంటల కొక బౌన్సు చొప్పున నీయవలయును. గర్భస్రావమునకు, అతి స్రావమునకు, దీర్ఘవిరేచనవ్యాధికి, ఉపయోగింపనగును. కురుపులు కలిగినపుడును ఉపయోగింపనగును.

(2) నీటితోగలిసిన సల్ఫూరిక్ ఆసిడ్
 (డైల్యూట్) 2 డ్రా.
 టింక్చర్ ఆఫ్ జింజర్ 1 డ్రా.
 జలము 8 బౌ.

నాలుగుగంటల కొకబౌన్సు చొప్పున నీయవలయును. గర్భస్రావమునకును శ్వాసకోశములనుండి రక్తమువచ్చుటకును, అజీర్తికిని, యియ్యనగును. ఈమందు పుచ్చుకొనినపిమ్మట నీటితో పుక్కిలించి ఉమ్మివెయ్యవలయును.

(3) ఆపిశేట్ ఆఫ్ లెడ్ 3 గ్రె.
 టింక్చర్ ఆఫ్ ఓపియం 5 మి.
 జలము 1½ బౌ

ప్రతి మూడుగంటలకుగాని నాలుగు గంటలకుగాని పుచ్చుకొనవలయును. శ్వాసకోశములనుండిగాని, ప్రేగులనుండిగాని, రక్తము స్రవించుట కీయ

(4) నీటితోగలిసిన సల్ఫ్యూరిక్ ఆసిడ్	25 మి.
(డైల్యూట్)	
టింక్చర్ ఆఫ్ ఓపియం	8 మి.
జలము	1½ ఔ.

దినమునకు మూడు పర్యాయము లీయవలయును. శ్వాసకోశములనుండియు, అన్నకోశమునుండియు, రక్తము వచ్చినప్పు డీయనగును. అజీర్తి విరేచనములకును కలరాయందును పనికివచ్చును. ఆరుమాసముల బిడ్డకు అరద్రాము యీయనగును. ఒక్కొక్కద్రాము మందునందు సుమారు ఒక చుక్క- టింక్చర్ ఓపియం ఉండును. బిడ్డయొక్క వయస్సునుబట్టి సంవత్సరమున కొకద్రాము చొ॥ యీమందును యియ్యవచ్చును. ఓపియం కలిపి, యున్న ప్రతిమందును బిడ్డలకు బహుజాగ్రత్తతో నీయవలసి యుండును. నాలుగు గంటలకంటె నెక్కువ తరుచుగ నీ మందును యియ్యగూడదు.

(5) గాలిక్ ఆసిడ్	5 గ్రా.
జలము	2 ఔ.

దినమునకు మూడుసారు లీయవలయును. శ్వాసకోశములనుండిగాని అన్నకోశమునుండిగాని రక్తము

వచ్చుటయందును, స్కర్వీయందును, అజీర్తియం
దును, అజీర్తి విరేచనములయందును, అతివిరేచన
ములయందును యీమందు నీయనగును.

(6) ఆసిపేట్ ఆఫ్ లెడ్ 3 గ్రె.

యక్ష్మాక్ష్టు ఆఫ్ ఓపియం $\frac{1}{4}$ గ్రె.

బాగుగా కలిపి మాత్రగా జేయవలయును.
ఒక్కొక్క మాత్ర చొప్పున దినమునకు మూడు
సార్లు పుచ్చుకొనవలయును. రక్తస్రావమున కుప
యోగించును. అజీర్తి విరేచనములయందును, అతి
విరేచనములయందును, ఉపయోగించును.

(7) పల్విస్ క్రేటా ఆరోమేటిక్ 5 గ్రె.
కం ఓపియం

సోడా బై కార్బనెట్ 1 గ్రె.

ఆలం (పటిక) పొడి 1 గ్రె.

పవుడరుగా చేయ వలయును. విరేచనముల
యందు ప్రతిరాత్రియును, అవసరమయితే ఉదయ
మునను రాత్రియుగూడ, ఒకపవుడరు పుచ్చుకొన
వలయును. అతివిరేచనముల యందును, బిడ్డలకు
అజీర్తి విరేచనముల యందును, ఉపయోగింప
నగును.

1½ సం॥ మొదలు 2 సం॥ వరకును వయసు గలిగిన బిడ్డకు 5 గ్రెయినులు ఫల్వీస్ క్రేటా ఆరో మేటిక్ కం ఓపియం యియ్యవచ్చును. ఇందులో ఓపియం ½ గ్రెయిను ఉండును. ఒక సంవత్సరము వయసునం దిందులో సగము యియ్యవలయును. ఆరుమాసముల వయసునం దిందులో నాలవవంతు యియ్యనగును.

డయూరిటిక్సు; డయఫారిటిక్సు.

(Diuretics ; Diaphoretics.)

మూత్రగ్రంథులపై నయును, మూత్రకోశముల పై నయును పనిచేయుటవలన మూత్రమును వృద్ధి పరచునట్టి మందులకు డయూరిటిక్సు అని పేరు. ఈమందులలోనే విశేషము, చర్మభాగములయందు పనిచేసి చెమటను అధికపరచు గుణమును గలిగి యుండుటచే, డయఫారిటిక్సు అనియు పిలువబడును.

1) పొటాష్ నైట్రేట్	1 గ్రా.
స్పిరిట్ ఈతర్ నైట్రేట్	3 గ్రా.
జలము	8 ఓ.

నాలుగుగంటల కొకసారి ఒక్కొక్క ఔన్ను
చొప్పున నీయవలయును. జ్వరమునందును, మూత్ర
మును వృద్ధిపరచుటకును, యియ్యనగును.

(2) పొటాస్ నైట్రేట్	40 గ్రె.
స్పిరిట్ ఈతర్ నైట్రేట్	2 ద్రా.
వైన్ ఆఫ్ కాల్చికం	3 ద్రా.
జలము	8 ఔ.

దినమునకు మూడుపర్యాయములు ఒక్కొక్క
ఔన్ను చొప్పున నీయవలయును. కీళ్ళనొప్పులయం
దీయనగును.

(3) పొటాస్ నైట్రేట్	40 గ్రె.
స్పిరిట్ ఈతర్ నైట్రేట్	2 ద్రా.
టింక్చర్ ఆఫ్ కెంతారిడీస్	2 ద్రా.
జలము	8 ఔ.

కలరాయందు మూత్రము బంధించి నప్పుడు
మూడుగంటల కొకఔన్ను చొప్పున నీయనగును.

కఫహారులు (Expectorants.)

శ్వాసకోశములకు బోవు వాయుమార్గముల
యందును, కొంతవరకు దేహమంతటను, బనిచేయు

టవలన, దగ్గు ఉబ్బసము మొదలగు శ్వాసవ్యాధులలో శ్వాసకోశములయందును శ్వాసకోశములకు సంబంధించిన తిత్తులయందును స్రవించు ద్రవపదార్థములను వెలిబుచ్చుటకు ఉపయోగించు మందులు యొక్క స్పెక్టోరెంట్లు (కఫహారులు) అనబడును.

(1) స్పిరిట్సు ఆమ్మోనియా ఆరోమేటిక్	2 ద్రా.
స్పిరిట్ ఈతర్ నైట్రస్	4 ద్రా.
టింక్చర్ జింజిబ్రస్	1 ద్రా.
జలము	6 షె.

రెండు గంటలు లేక మూడుగంటల కొకపర్యాయము ఒక్కొక్క షెన్సు చొప్పున నీయవలయును. ఉబ్బసపుదగ్గు యొక్క ఉద్మతస్థితియం దీయనగును.

(2) క్యంఫర్	1 గ్రె.
ఇపికాక్ పవుడరు	3 గ్రె.

కొంచెము జిగురుతో కలిపి మాత్రగా జేయవలయును. ఉబ్బసమునందు రెండు గంటల కొక మాత్ర పుచ్చుకొనవచ్చును.

(3) మెగ్నీషియా కార్బనస్	25 గ్రె.
పెప్పర్ మంటు ఆయిల్	2 మి.
జలము	1 షె.

ఒకటి రెండు సంవత్సరముల పయనుగల బిడ్డకు కోరింత దగ్గునందు దినమునకు మూడులేక నాలుగు పర్యాయములు ఒకద్రాముచొప్పున నీయవచ్చును. మందు వాడుటకు ముందుగా బుడ్డిని కదలించ వలయును.

బలవర్ధకౌషధములు (Tonics.)

శరీరము, శోషింపజేయు వ్యాధులచే బీజింప బడిన పిమ్మట, స్వస్థావస్థయందు బలమునందుట కీయదగిన కౌషధములకు బలవర్ధకౌషధములు (Tonics) అనిపేరు. ఇవి శరీరమునందు ఉద్రేకమును బుట్టించక నెమ్మదిగా బనిచేయును. లోహ సంబంధమగు బలవర్ధకౌషధములు రక్తమునందలి అందు సంబంధమగు లోపమును బూర్తిజేయును.

(1) క్వీనీన్ సల్ఫేట్	20 గ్రె.
షెరీ వైన్	2 ఔ.
జలము	8 ఔ.

గొగుగాగలిపి, ఒక ఔన్నుచొప్పున దినమునకు మూడుసారు లీయవలయును.

(2) క్వీనీన్ సత్ఫేట్	24 గ్రె.
నిమ్మరసము (నిమ్మకాయల నుండి అప్పుడు తీసినది.)	2 ద్రా.
జలము	8 ఔ.

బాగుగాగలిపి, ఒక ఔన్నుచొప్పున దినమునకు
మూడుసారు లీయవలయును.

(3) ఫెర్రయి యెట్ క్వీనీన్ సిట్రస్	40 గ్రె.
జలము	8 ఔ.

బాగుగాగలిపి, మూడు లేక నాలుగు గంటలకు
ఒక ఔన్ను చొప్పున పుచ్చుకొనవలయును. ఈ
మందు పుచ్చుకొనిన పిమ్మట నోరు కడుగుకొన
వలయును. లోహ సంబంధ మగు ఔషధములన్ని
యు విరేచనమునకు నలుపురంగును పుట్టించును.

(4) ట్రిక్చర్ ఫెర్రయి పెర్క్లోర్	2 ద్రా.
జలము	8 ఔ.

ఒకొక ఔన్ను చొప్పున దినమునకు మూడు
సార్లు పుచ్చుకొనవలయును. పాండురోగమునందును
నీరసవ్యాధి యందును యీయనగును. మందు
పుచ్చుకొనిన పిమ్మట నోరు కడుగుకొనవలయును.

5. క్విసీన్ సల్ఫేట్	24 గ్రె.
ఫెర్రయి సల్ఫేట్	24 గ్రె.
మెగ్నీసియా సల్ఫేట్	1 ఔ.
డై ల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ ఆసిడ్	
నీటితో గలిపిన	2 ద్రా.
జలము	12 ఔ.

మోతాదుకు ఒక బౌన్సు చొప్పున దినమునకు
మూడు సార్లు యాయవలయును.

(6) సల్ఫేట్ ఆఫ్ ఐరన్	9 గ్రె.
క్విసీన్ సల్ఫేట్	12 గ్రె.
డై ల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ ఆసిడ్	1 ద్రా.
సల్ఫేట్ ఆఫ్ సోడా	1 ఔ.
తెల్లని చక్కెర	2 ద్రా.
జలము	12 ఔ.

ఒక బౌన్సు చొప్పున దినమునకు రెండు లేక
మూడు సార్లు పుచ్చుకొన వలయును. విరేచన
బద్ధముతో గూడి నట్టియు నెప్పితో గూడినట్టియు
ఋతు స్రావమునకు యాయనగును. కారిజ
స్త్రీహవ్యాధులయందు బలవర్ధకౌషధముగ నీయ
వచ్చును.

కుష్ఠవ్యాధి (Leprosy.)

హాల్ మొగ్రా ఆయిల్ ను వ్యాధి ఆవరించిన స్తలమునందు దినమునకు 20 నిమిషములకాలము రుద్దవలయును. ఈమందునకే ఓలియం గై నొకార్టీ అను పేరుకూడ కలదు. దీనినే 10 మినిములమోతాదులో పాలలోగలిపి, దినమునకు మూడుసారులు లోన కియ్యవలయును. మోతాదును రెండుద్రాములవరకు క్రమముగా హెచ్చింపనగును. ఈ చికిత్స 6 లేక 7 సంవత్సరములవరకు చేయవలసియుండును.

గవదలు (Mumps.)

సాధువిరేచనకారిగ పనిచేయుటకు మొదటగా చిట్లాముదము నియ్యవలయును. పిమ్మట యీక్రింది మందు నియ్యవలయును.

పోటాసియం బ్రొమైడ్	20 గ్రె.
ఫెనాసిటిన్	8 గ్రె.
కెఫీన్ సిట్రిస్	2 గ్రె.

వీని నన్నిటినిగలిపి 4 మోతాదులుగ జేయవలయును. 8 లేక 10 సంవత్సరములు వయస్సుగల బిడ్డకు, మొదటిమోతాదును యిచ్చినపిమ్మట, రెండవమోతాదును 4 గంటలతరువాతయును, మూడవ

మోతాదును 6 గంటల అనంతరమును, నియ్యవలయును. పెద్దవారల కై నయెడల 4 గంటల కొక మోతాదు చొ॥ 4 మోతాదుల నియ్యవలయును. పీమ్మట నొప్పి పోవువరకును రెండుగంటల కొక మోతాదు నియ్యవలయును.

వాపుదలభాగముల వేడి కాపడములను గాచ నలయును. వ్యాధికాలమందు తేలికగ జీర్ణమగు పదార్థములనుమాత్రమే పుచ్చుకొనవలయును. పాలను, రొట్టెను పుచ్చుకొనవచ్చును. వాపుదలపోవు వరకును నమలుటను మానివేయవలయును.

గోరుచుట్టు (Whitlow.)

ప్రారంభమునందు బలమగు విరేచనకారి నియ్య వలయును. అస్వస్థతభాగమునకు రెండుగంటల కొక సారి వేడి కాపడముల నిచ్చి, చేతిని యెత్తిపెట్టు స్థితిలో నుంచవలయును. చీము మొదలగు చెడు పదార్థములను వెలిబుచ్చుటకుగాను సామాన్యముగ శస్త్రము అవసరమగును. ఇందునుగురించి అశ్రద్ధ జేసినయెడల, ఒకప్పుడు వ్రేలునకును, మరియొకప్పుడు ప్రాణమునకుగూడ, అపాయము కలుగ వచ్చును. రోగికి క్రమమైన ఆహారమునిచ్చుచు, అవ

సరమైన యెడల బలవర్థకౌషధములగూడ నియ్య నగును.

మూత్రకృచ్ఛము (Stone in the Bladder.)

మూత్రకృచ్ఛ సంబంధమగు తెర కలిగినపుడు బాధ కుపశాంతిని గలుగ జేయవలయును. రోగిని వేడినీళ్లతోబైలో గూర్చుండబెట్టి, 25 గ్రెయినుల క్లోరల్ హైడ్రేట్ను నియ్యవలయును. బాధ తగ్గని యెడల, 8 గంటలకు మరల నియ్యవలయును. నడు ముపైన వేడికాపడములను గాచవలయును. మల బంధ ముండినయెడల, విరేచనకారి నియ్యవలయును. బాల్స్ నీళ్ళను విశేషముగ ద్రాగవలయును.

ఎరుపుమూత్రకృచ్ఛ ముండినయెడల, శాక సంబంధమగు ఆహారములను మాత్రమే భుజింప వలయును. 10 గ్రెయినుల 'పోటాస్ బై కార్బినస్' ఓ ఒక ఔన్ను జలములో గలుపుచు, దినమునకు యీదుపర్యాయములు పుచ్చుకొనవలయును. విరే చనకారి నప్పుడప్పుడు ఉపయోగించు చుండ వల యును. పైపరజీన్ (Piperazine) అను ఔషధము మిగుల ఉపయోగము. దీనియొక్క మోతాదు 4

గ్రెయినులు మొదలు 10 గ్రెయినులవరకు అయి
యున్నది.

తెలుపుమూత్రకృచ్ఛము నందు, డైల్యూట్
(నీటితోగలిపిన) వైటిక్ ఆసిడ్ 20 మినిములను
నాలుగు బౌన్సుల జలములో గలిపి యియ్యవల
యును. క్వీనీన్ ను బలవర్ధకౌషధముగ నియ్యనగును.

మూత్రకృచ్ఛము యొక్క అన్ని తరగతుల
యందును మంచిసీశ్శ నెక్కువగ ద్రాగవలయును.
ఒకటంబ్లరు ఉడుకుసీశ్శను, ఉదయమునను, మధ్యా
హ్నమునను, సాయంకాలమునను, ద్రాగుచుండ
వలయును. భోజనమును ద్వరితముగ జేయవలసి
యుండును. విస్తారము సేపు పరుండియుండ కూడదు.
అట్లు చేసినయెడల, మూత్రకృచ్ఛ మేర్పడుట
కనువు యెక్కువగును. వేడిస్నానములు, మొరటు
తువ్వాళ్ళతో నెక్కువగ దుడుచుకొనుట, ప్లానల్
దుస్తులు, నిస్త్రాణను గలుగజేయని శరీరసాధకము,
అవసరములయి యున్నవి.

వాంతులు (జీర్ణకోశ సంబంధమగు)

(Vomitting-Gastric.)

బిస్మత్ సబ్ నైట్రేట్ నుగాని, బిస్మత్ కార్బనస్ నుగాని, 10 గ్రెయినుల మోతాదులో 4 గంటల కొకసారి యియ్యవలయును.

వాంతులతోగూడ, తలనొప్పి, జ్వరత, ఒడలంతయు నొప్పి, యుండి యుండినయెడల ఒక్కొక్క మోతాదునందు 5 గ్రెయినుల డోవర్సుపౌడరును గూడ గలిపినయెడల మంత్రమువలె పనిచేయును.

డోవర్సు పౌడరులో నల్లమంచు ఉండునుగనుక, బిడ్డలకును, కొందరి వయస్కులకునుగూడ, యీ పౌడరు శరీరతత్వమునకు సరిపడక పోవచ్చునుగాన, దీనినిమానివేసి ఒక్కొక్క మోతాదునందు మెగ్నీసియం కార్బనస్ 10 గ్రెయినులను గలుప నగును.

అతిసారవిరేచనములు (దీర్ఘవ్యాపితమగు)

(Diarrhoea-Chronic.)

ఓక్టాన్రీక్టు బేలి లిక్విడ్	4 డ్రా.
ప్రెట్స్ క్లోరోఫారం	20 షి.
జలము	4 షా.

6 గంటల కొక ఔన్ను చొ॥ యియ్యవలెను.

వీర్యనష్టము (Spermatorrhea)

- (1) యక్ష్వాక్ష్మ డామియానా లిక్విడ్ 1½ ట్రా.
 టింక్చర్ జింజిబ్రస్ 20 మి.
 కొంచెము చక్కెర
 జలము 3 ఔ.

ఒక్కొక్క ఔన్ను మోతాదులో దినమునకు
 మూడుసారు లియ్యవలయును.

- (2) యక్ష్వాక్ష్మ డామియానా సాలిడ్ ను 2 గ్రెయి
 నుల మాత్రలను జేసి దినమునకు రెండు మాత్ర
 ల చొ॥ సేవింపవలయును.

- (3) రోగి సంతోషముగ నుండ వలయును. గట్టి
 పాన్పులపై బడుండవలయును. వెల్లకిలి పరుండ
 రాదు. చల్లని నీటితో శిరస్నానము చేయ
 నగును.

పాముకాటు (Snake Bite.)

పాముకాటునకు వెంటనే చికిత్స చేయవలయును
 లేనిచో లాభముండదు. కాటునకు సమీపమున
 అనగా కాటునకు కొంచెముగా పైయెత్తున, గట్టిగ
 కట్టునుగట్టి, పదునైన చిన్నకత్తిని దీపముపైనగాచి,
 యీకత్తితో కాటుస్థానమున + గుర్తురూపము:

గీరవలయును. ఇట్లు గీరుట మూలమున వచ్చిన రక్తమును వీలై నంతవరకు పిండివేసి, ఆగాయమునందు కొంచెము పొటాష్ పర్మాంగనేట్ పొడిని చొప్పించి, దానిని బాగుగా గాయములోనికి రుద్దవలయును.

రోగికి మగత కలుగుచుండినయెడల 10 చుక్కల లిక్కర్ అమ్మోనియాను ఒక ఔన్ను జలములో వేసి యియ్యవలయును. అవసరమని తోచినయెడల యీమందును మరల యిచ్చుచుండవలయును.

తేలుకాటు (Scorpion Sting.)

వినిగర్ ను కాటుపై న గట్టిగా రుద్దవలయును.

నెప్పి నయము కానియెడల, పటికను కొవ్వు వత్తి దీపముపైన కరగించి, దానిని వెంటనే కుట్టిన స్థానమున అద్దవలయును.

కుట్టిన వెంటనే చల్లనిజలమును త్రాగినయెడల బాధ వ్యాపింపకుండ నుండునని చెప్పవచ్చును.

పులిపిరి కాయలు (Warts.)

స్వచ్ఛమైన నైట్రిక్ ఆసిడ్ ను సూక్ష్మముగా పులిపిరికాయలపై నద్దవలయును.

అనుక్రమణిక I.

ఏ ఔషధయోగమునందైనను జలము 4 ఔస్సులు అని వ్రాసియుండినయెడల మిశ్రితౌషధమంతయు 4 ఔస్సులు అగువరకును జలమును గలుపవలయునని తెలిసికొనవలయును. ఇటులనే యిట్టి ప్రతి విషయమునందును గ్రహింపనగును.

ఇన్ ఫ్యూజన్ సార్సా అనగా సుగంధిపాల కషాయము.

ఇన్ ఫ్యూజన్ డిజిటాలిస్ అనగా డిజిటాలిస్ ఆకులతో జేసినకషాయము. దీనికిబదులుగా టింక్చరు డిజిటాలిస్ ను మోతాదు ఒకటికి 5 మినిముల చొ॥ గలిపి తక్కినభాగమును జలమును గలుపుకొనవచ్చును.

ఇన్ ఫ్యూజన్ బక్కు, ఇన్ ఫ్యూజన్ సెనిగా, ఇన్ ఫ్యూజన్ సెన్నా, ఇన్ ఫ్యూజన్ జన్నన్ - వీటియన్నిటి విషయయులలోను ఆయా కషాయములు సందర్భపడనపుడు ఆయా టింక్చర్లను మోతాదు

ననుసరించి సూక్ష్మముగా గలిపి, తక్కిన భాగము నకు జలమును గలుపవలయును. మోతాదు యొక టికి టింక్చర్లు కొన్ని మినిములలోమాత్రమే ఉండు నని గ్రహింపవలయును.

ఆక్వాక్లోరోఫారమునకు బదులుగా ప్రతిబౌన్సు మిశ్రితౌషధమునకు 10 మి. స్పిరిట్స్ క్లోరోఫార మును గలుపుకొని తక్కినది జలమును గలుపుకొన నగును.

స్పిరిట్స్ క్యాంఫర్. తూనికప్రకారము 1 ద్రా. ఆల్కహాలును 1 ద్రాము హారతికర్పూరమును గలిపినయెడల స్పిరిట్స్ క్యాంఫర్ అగును.

ఆక్వాక్యాంఫర్ కావలసి వచ్చినపుడు ప్రతిబౌన్సు మిశ్రితౌషధమునకును 2 లేక 3 మినిముల స్పిరిట్స్ క్యాంఫరును గలుపుకొని తక్కినది జలమును గలుపుకొన నగును.

ఆక్వా అసీతి కావలసివచ్చినపుడు యిందు సంబంధమగు చమురును, అనగా ఓలియం అసీతిని, మిశ్రితౌషధమునకంతకును 1 లేక 2 చుక్కలను గలిపిన చాలును.

మిస్టూరా సెన్నాకో సందర్భపడనపుడు రెండవ పక్షముగా టింక్చర్ సెన్నాకోను ఉపయోగింపవచ్చును గాని టింక్చరుయొక్క మోతాదు $\frac{1}{2}$ ద్రాము మొదలు 1 ద్రామువరకు మాత్రమే అయియున్న సంగతిని గమనింపవలయును.

ఆక్వామెంతా పిప్ను ఉపయోగింపవలసి వచ్చినపుడు మిశ్రితౌషధమునందంతను 3 లేక 4 చుక్కలు పెపర్మంట్ ఆయిల్ ను ఉపయోగింపవచ్చును.

సిరప్ ఆరంటీ సందర్భపడనపుడు మోతాదు ఒకటికి 5 మి. చొప్పున టింక్చర్ ఆరంటీని గలిపి, కొంచెము చక్కెరనుగూడ మిశ్రితముచేసి, తక్కినది జలభాగమును గలుపనగును.

ఆసిడ్ సల్ఫూరిక్ డైల్యూట్ ను చేయుటకు గాను, 4 ద్రాముల సల్ఫూరిక్ ఆసిడ్ ను 40 ద్రాముల జలములో నెమ్మదిగా గలుపుచు, చల్లారిన పిమ్మట మరి $8\frac{1}{2}$ ద్రాముల జలమును మరల గలుపవలయును.

ఆసిడ్ నైట్రిక్ హైడ్రోక్లోర్ డైల్యూట్.

దీనిని తయారు చేయుటకుగాను, 3 భాగములు నైట్రిక్ ఆసిడ్, 4 భాగములు హైడ్రో క్లోరిక్

ఆసిడ్, జలము 25 భాగములు, వీని నన్నిటిని గలిపి నిలువ యుంచుకొనవలయును.

తైకర్ అమ్మోనియా ఆసిటేటిస్ (డైల్యూట్) ను యాక్రిండిప్రకారము తయారు చేయవలయును.

1 ఔన్సు అమ్మోనియా కార్బనస్ ను 10 ఔన్సుల జలములో గలిపి, “రెడ్” లిట్మస్ కాగితమును దీనిలో ముంచినయెడల “బ్లూ” కాకుండు నంతవరకును, బ్లూలిట్మస్ కాగితమును దీనిలో ముంచినయెడల యెరుపు కాకుండు నంతవరకును దీనియందు ఆసిటిక్ ఆసిడ్ ను గలిపి, పిష్కాట నిది యొక పైంటు అగు నంతవరకును జలమును గలిపి, ఆకుపచ్చ సీసాలో నిలువచేయవలయును. ఆసిటిక్ ఆసిడ్ ను అవసరమైన దానికంటె నెక్కువ గలుపకుండ జాగ్రతను బుచ్చుకొనవలయును. దీనియొక్క మోతాదు 2 ద్రాములు మొదలు 6 ద్రాములవరకు అయియున్నది.

ఆసిడ్ వైట్రిక్ డైల్యూట్ అనగా 10 ద్రాముల జలములో 1 ద్రాము వైట్రిక్ ఆసిడ్ గలిసినట్టిది. దీనియొక్క మోతాదు 10 మి. మొదలు 30 మి. వఱకును అయియున్నది.

అనుక్రమణిక II.

ఈ గ్రంథమునందు తెలుగున వ్రాయబడిన ఆంగ్లేయకాషధములయొక్క పేర్లు చదువరుల ఉపయోగమునకై ఆంగ్ల భాషయం దీ క్రింద వివరింపబడినవి.

అ

అతిమధురము (Liquorice)

అమ్మోనియా అయొడైడ్ (Ammonia Iodide)

అమ్మోనియా కార్బనస్ (Ammonia Carbonas)

అమ్మోనియం క్లోరైడ్ (Ammonium Chloride)

అమ్మోనియా ఫాస్ఫస్ (Ammonia Phosphas)

అమ్మోనియం బ్రొమైడ్ (Ammonium Bromide)

అమ్మోనియా సాలిసైలస్ (Ammonia Salicylas)

అయొడిన్ (Iodine)

అలాయిన్ (Aloin)

అవిసిసూనె (Linseed Oil)

ఆక్వా అనీతి (Aqua Anethi)

ఆక్వా క్యాంఫర్ (Aqua Camphor)

ఆక్వా క్లోరోఫారం (Aqua Chloroform)

ఆక్వా మెంథా పిప్ (Aqua Menth. Pip)

ఆయిల్ ఆఫ్ అనిసీడ్ (Oil of Aniseed)

ఆరిస్టాల్ (Aristol)

ఆర్సెనిక్ అయోడైడ్ (Arsenic Iodide)
 ఆలం (పటిక) (Alum)
 ఆలివ్ ఆయిల్ (Olive Oil)
 ఆలెట్రీస్ కార్డియల్ (Aletris Cordial)
 ఆల్కహాల్ (Alcohol)
 ఆసిటేట్ ఆఫ్ లెడ్ (Acetate of Lead)
 ఆసిడ్ ఆర్సెనియస్ (Acid Arsenious)
 ఆసిడ్ నైట్రోహైడ్రోక్లోరిక్ డిల్ (Acid Nitro Hydrochlor Dil)
 ఆసిడ్ ఫాస్ఫారిక్ డైల్యూట్ (Acid Phosphoric Dil.)
 ఆసిడ్ సల్ఫూరిక్ (Acid Sulphuric)
 ఆసిడ్ సాలిసైలిక్ (Acid Salicylic)
 ఆసిడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ డైల్యూట్ (Acid Hydrochlor Dil.)
 అంగ్యుయెంటం బెలడోనా (Ung. Belladonna)
 అంగ్యుయెంటం హైడ్రోడైడ్ రూబ్రి (Ung. Hydr. Iodide Rubri)
 అంటిమోనీ టార్టరేట్ (Antimony Tartarate)

ఇ

ఇంగ్లూవిన్ (Ingluvin)
 ఇన్ ఫ్యూజన్ జన్స్ కో (Inf. Gentian Co)
 " బుక్కు " Buchu)
 " సార్సా " Sarsa)
 " సెన్నా " Senna)
 " సెనిగా " Senega)
 ఇక్ఠియల్ (Ichthyol)

ఓ

లియం క్యూబెబ్ (Oleum Cubeb)

„ గైనో కార్డి „ Gynocarde)

„ శాంటాల్ ఫ్లేవి „ Santal Flavi)

„ సి నేపిస్ „ Sinapis)

క్రైసార్బైన్ (Chrysarobine)

కార్బోలిక్ ఆసిడ్ (Carbolic Acid)

కాల్షియం సల్ఫైడ్ (Calcium Sulphide)

క్రెయిసోట్ (Creasote)

క్రెసోనిక్ ఆసిడ్ (Chrysophonic Acid)

క్రీం ఆఫ్ టార్టార్ (Cream of Tartar)

క్రీం ఆఫ్ మాల్ట్ అండ్ కాడ్ లివర్ ఆయిల్ విత్ క్రియ
సోట్ అండ్ హైపోఫాస్ఫైట్స్ (Cream of Malt
and Cod liver Oil with Creasote and Hy-
pophosphites)

క్వినిన్ బ్రొమైడ్ (Quinine Bromide)

„ సల్ఫేట్ „ Sulphate)

„ మ్యూరియస్ „ Murias)

„ హైడ్రోక్లోర్ „ Hydrochlor)

కఫీన్ సిట్రస్ (Caffine Citras)

కయిలిన్ (Kaolin)

కోడినా ఫాస్ఫస్ (Codeina Phosphas)

క్లోరల్ హైడ్రేస్ (Chloral Hydras)

గ

గం అకేసియా (Gum Acacia)

గ్యాలిక్ ఆసిడ్ (Gallic Acid)

గ్వాయిపల్ కార్బనస్ (Guiacol Corbonas)

గ్లిసరిన్ (Glycerine)

గ్రే పౌడర్ (Grey Powder)

గ్లైకోథైమోలైన్ (Glycothymoline)

జ

జింక్ ఆక్సైడ్ (Zinc Oxide)

„ పర్మాంగనేట్	„ Permanganate)
„ బ్రొమైడ్	„ Bromide)
„ వెలీరియేనస్	„ Valerianus)
„ సల్ఫేట్	„ Sulphate)

ట

టర్పెన్ టీన్ (Turpentine)

టార్టారిక్ ఆసిడ్ (Tartaric Acid)

ట్యానిక్ ఆసిడ్ (Tannic Acid)

టింక్చర్ ఆయోడిన్ (Tincture Iodine)

„ అసాఫటిడా	„ Asafetidae)
„ ఆకొనైట్	„ Aconite)
„ ఆరంటీ	„ Aurantii)
„ ఆర్నికో	„ Arnico)
„ ఓపియం	„ Opium)
„ కన్వలెరియామజలిస్,	„ Convall. majalis)
„ కలంబా	„ Calumba)
„ కాప్సికం	„ Capsicum
„ కార్దమం కో	„ Cardamom Co.)
„ క్యాంఫర్ కో	„ Camphor Co.)

చింకర్ కంతారిడిస్	(Tincture Cantharidis)
,, క్లోరోఫారం కో	,, Chloroform Co.)
,, గ్వాయకై అమ్మోనియేటా	,, Guaiaci Ammon.)
,, గ్వాయిపం	,, Guaiaci)
,, జస్మిన్ కో	,, Gentian Co.)
,, జింజిబ్రస్	,, Zingibras)
,, జెల్సిమియం	,, Gelsimium)
,, డిజిటాలిస్	,, Digitalis)
,, నక్సువామికా	,, Nux Vomica)
,, పొడాఫైలిన్ అమ్మోనియేటా	,, Podoph Ammon)
,, బెలడోనా	,, Belladonna)
,, బెంజాయిన్ కో	,, Benzoin Co.)
,, మిర్	,, Myrrh)
,, రీయే కో	,, Rhei Co.)
,, లావండ్యూలా కో	,, Lavandulae Co.)
,, లోబెలియా యిథర్	,, Lobel. Ether)
,, వేలరీయన్ అమ్మోనియేటా	,, Valer. Ammon.)
,, సిల్లా	,, Scillae)
,, సింకోనా	,, Cinchona)
,, స్ట్రోఫాంతస్	,, Strophanthus)
,, హామామలిస్	,, Hamamelis)
,, హయోసామి	,, Haoscyami)

డ

డనవన్స్ సాల్యూషన్ (Donovan's Solution)
 డోవర్స్ పౌడర్ (Dover's Powder) or
 లేక (పల్వీస్ ఇపెకాక్ కో) (Pulv. Ipecac Co.)

త్ర

తియొకాల్ (Theocol)

తియొసిన్ సోడా ఆసిటేట్ (Theocin Soda Acetate)

తైమోల్ (Thymol)

ద

దాల్చిని అరఖ (Cinnamon Oil)

న

నైట్రిక్ ఆసిడ్ (Nitric Acid)

ప

పన్నీరు (Rose Water)

పల్వీస్ ఇపికాక్ (Pulv. Ipecac)

,, క్రేటాఆరోమేటిక్,, Creta Arom.)

,, ,, కం ఓపియం,, ,, Cum Opium)

,, జాలప్ కో,, Jalap Co.)

,, ట్రాగకాంత్,, Tragacanth)

,, డిజిటాలిస్,, Digitalis)

,, రీయే,, (Rheii)

,, సిల్లే,, Scillae)

పర్క్లోరీడ్ ఆఫ్ మర్క్యురీ (Perchl. of Mercury)

పారఫిన్ ఆయింట్ మెంట్ (Paraffin Ointment)

పిల్లూలా ఆలోస్ యెట్ (Pil. Aloes et

అసాఫటిడా Asafetidae)

పిల్లూలా ప్లంబికంఓపియం (Pil. Plumbi cum Opium)

పెట్రోలియం (Petroleum)

పెప్సిన్ వైన్ (Pepsin Wine)

ఫెనాసిటిన్ (Phenacetin)

పెప్పర్మంట్ ఆయిల్ (Pepperm. Oil)

ఫెర్రయి అర్సెనస్ (Ferri Arsenas)

,, యెట్ అమ్మోనియా సిట్రస్ (Ferri et Ammon. Citras)

,, యెట్ క్వినీన్ సిట్రస్ ,, Quin. Citras)

,, బ్రొమైడ్ ,, Bromide)

,, సల్ఫేట్ ,, Sulphate).

ఫ్లెక్సిబిల్ కలాయిడ్యం (Flex. Collodium)

పొటాస్ అయోడైడ్ (Potass. Iodide)

,, ఆసిటస్ ,, Acetas)

,, క్లోరస్ ,, Chloras)

,, నైట్రస్ ,, Nitras)

,, పర్మాంగనస్ ,, Permanganas)

,, బై కార్బనస్ ,, Bicarbonas)

,, బ్రొమైడ్ ,, Bromide)

,, సిట్రస్ ,, Citras)

పొడాఫ్ఫెలం రెజిన్ (Podoph. Resin)

2)

బాల్సం కొపేబా (Balsam Copaiba)

,, పెరువియాని ,, Peruviani)

బిస్మత్ కార్బనస్ (Bismuth Carbonas)

,, సబ్ నైట్రస్ ,, Subnitras)

,, సాలిసైలస్ ,, Salicylas)

బీటా నాఫ్థాల్ (Beta Naphthol)

బెర్గమాట్ ఆయిల్ (Bergamot Oil)

బెలడొనా ఆయింట్ మెంట్ (Belladonna Ointment)

బొరాక్సు (వెలిగారము) (Borax)

బోరిక్ ఆయింట్ మెంట్ (Boric Ointment)

„ ఆసిడ్ (Boric Acid)

మ

మాల్టీన్ అండ్ కాడ్ లివరు ఆయిల్ (Maltine & Cod liver Oil)

మిస్చురా సెన్నా కో (Mistura Senna Co.)

మెగ్నీసియా కార్బనస్ (Mag. Carbonas)

„ బైకార్బనస్ „ Bicarbonas)

„ సల్ఫేట్ „ Sulphate)

„ సిట్రస్ „ Citras)

మెంథాల్ (Menthol)

య

యట్టాన్త్రిక్టు ఓపియం (Extr. Opium)

„ కాలాసింత్ కో „ Colocynth Co.)

„ కాస్కారా సా గ్రాడా „ Cascara Sagrada)

„ జెన్షన్ „ Gentian)

„ జాంబులీన్ లిక్విడ్ „ Jambuline Liq.)

„ డామియానా లిక్విడ్ „ Damiana Liq.)

„ „ సాలిడ్ „ „ Solid)

యన్ట్రోప్ట నక్సువామికా	(Extr. Nux Vomica)
„ బెలడోనా	„ Belladonna)
„ బేలి లిక్విడ్	„ Belae Liq.)
„ యెర్గోట్ లిక్విడ్	„ Ergot Liq.)
„ హామామలిస్	„ Hamamelis)
„ హైడ్రాస్టిస్ కెనాడెన్సిస్	(Extra Hydr. Canadensis)
యూకలిప్టస్ ఆయిల్	(Eucalyptus Oil)

ర

రసభస్మము	(Calomel)
రిడ్యూస్డ్ ఐరన్	(Reduced Iron)
రెజిన్ గ్వయాక్	(Resin Guiac)

ల

లానోలీన్	(Lanoline)
ల్యాక్టిక్ ఆసిడ్	(Lactic Acid)
లినిమెంట్ అయోడిన్	(Liniment Iodine)
„ ఓపియం	„ Opium)
„ క్లోరోఫారం	„ Chloroform)
„ బెలడోనా	„ Belladonna)
„ మెంథాల్	„ Menthol)
లై కర్ అమ్మోనియా అసిటేటిస్	(Liq.Amm. Acetatis,
„ „ ఫారట్	„ „ Fort)
„ ఆర్సెనికాలిస్	„ Arsenicalis)
„ అమ్మోనియా సిట్రస్	„ Amm. Citras)

లైకర్ కాల్ఫైల్ యెట్ పల్సేటిల్లా Liq. Caulophyl et
Pulsatilla)

,, పొటాస్ ,, Potass.)

,, బిస్మత్ యెట్ పెప్సిన్ కో ,, Bismuth et
Pepsin Co. (Hewlett)

లైకర్ మార్ఫియా హైడ్రోక్లోర్ (Liq. Morphia
Hydrochlor)

,, సింకోనా హైడ్రోబ్రోమ్ ,, Cinchona
Hydrobrom)

,, సెడెన్స్ (Liq. Sedans)

,, స్ట్రిక్నిన్ హైడ్రోక్లోర్ (Liq. Strychnine
Hydrochlor)

,, హైడ్రాజ్జరై పర్క్లోర్ (Liq. Hydr. Perchlor)

లైమ్ వాటర్ (Lime Water)

వ

వాసలీన్ (Vaseline)

వినిగర్ (Vinegar)

వైనం ఆంటిమోనియాలిస్ (Vinum Antimonialis).

,, ఇపికాక్ ,, Ipecac)

,, కాల్చికం ,, Colchicum)

శ

శనటాజెన్ (Sanatogen)

శాంటోనీన్ (Santonine)

ష

హల్ మొగ్రా ఆయిల్ (Chaulmogra Oil)
షెర్రీ వైన్ (Sherry Wine)

స

సలాల్ (Salol)

సల్ఫర్ ఆయింట్ మెంట్ (Sulphur Ointment)
,, సబ్లిమేటం ,, Sublimatum)

సల్ఫేట్ ఆఫ్ ఐరన్ (Sulphate of Iron)

సాలిసైలిక్ ఆసిడ్ (Salicylic Acid)

సిట్రిక్ ,, (Citric ,,)

సిరప్ ఆరంటీ (Syrup Aurantii)

సిరప్ ట్రిఫాలియైకో (Syrup Tripl. Co.)

,, టోలు ,, Tolu)

,, ఫెర్రయి ఆయోడైడ్ (Syrup Ferri Iodide)

స్పిరిట్స్ ఆమ్మోనియా ఆరోమేటిక్ (Sp. Amm. Arcm.)

,, ఈతరిస్ కో ,, Etheris Co.)

,, ఈతర్ నైట్రస్ ,, Ether Nitras)

,, క్యాంఫర్ ,, Camphor)

,, క్లోరోఫారం ,, Chloroform)

,, రోజ్ మేరీ ,, Rosemari)

స్ట్రిక్చీన్ ఫాస్ఫస్ (Strych. Phosphas)

సీమ ఆముదము (Castor Oil)

సున్నపు నీళ్లు (Lime Water)

సోడా ఆయోడైడ్ (Soda Iodide)

,, కార్బనస్ ,, Corbonas)

,, సల్ఫేట్ ,, Sulphate)

సోడా క్లోరస్	(Soda Chloras)
,, బై కార్బనస్	,, Bicarbonas)
,, బ్రొమైడ్	,, Bromide)
,, సాలిసైలస్	,, Salicylas)
సోడియం గ్లైకోకొలలేట్	(Sodium Glycocholate)
,, హైపోసల్ఫయిట్	,, Hyposulphite)

హ

హెరాయిన్ హైడ్రోక్లోర్	(Heroin Hydrochlor)
హెల్మిటాల్	(Helmitol)
హైడ్రాక్సైడ్ ఆఫ్ ఫ్లేవి	(Hydr. Oxide. Flavi)
,, కం క్రేటా	,, Cum Creta)
(గ్రే పౌడరు)	(Grey Powder)

సూ చి క.

	పుట.		పుట.
అజీర్ణవ్యాధి	35,38	కఫహరులు	83,84,85
అతిమూత్రము	29,30	కలరా	25,26
అతివిరేచనములు	30,31,37	కంతులేర్పడుట	70
అతిసారవిరేచనములు	92	కారిజముయొక్క క్షీణత	23
అధికకాలము మంచముపట్టు		కారిజవ్యాధులు	35
టవలన గలుగుపుండ్లు	22	కాలినగాయములు	1
అస్థింజెంట్లు	78,79,80	కాళ్లు, చేతులు స్వాధీనము	
అకుపచ్చ విరేచనములు	31	నుండి తప్పి గంతులు	
అఘ్రాణలవణములు	86	వేయుట	27
అల్పరెటివులు	78,77,78	కీళ్లనొప్పి	82,63
ఇన్ ఫ్లూయెంజా	114	కురుపులు	14
ఉబ్బసము	13,15	కుష్ఠవ్యాధి	88
ఋతుస్రావ		కుసుమవ్యాధి	42
వ్యాధులు	12,37,39,42	కొఱుకు వ్యాధి	66,67
ఎలుకలు	87	కొఱుకుపుండు	25
ఏటికపాములు	73	కోరింతదగ్గు	58
ఒడలు దురదలు	69	గజ్జి	64
కడుపు ఉబ్బరము	75,78	గర్భస్రావము	10
కనురెప్పల ఉబ్బదల	15	గర్భణియందు వాంతులు	88

	పుట.		పుట.
గవదలు	88	తలనొప్పి	50
గుండెఆదరు	56	తలవెండ్రుకల వృద్ధికి	68
గుండెనంజు	57	తామర	74
గుండెవ్యాధి	71	త్రాగుడుయందు అభి	
గొంతు బొంగుపోవుట	65	లాషను మాన్పుటకు	28
,, (హిస్టీరియాలో)	15	త్రాగుబోతు నకు గలుగు సంధి	
గొంతునొప్పి	63	గుణము	29
గొంతుయొక్క రేగుదల	70	తిమురువాయువు	19
గొంతునొప్పికి గంధూ		తేనెటీగకాటు	18
పము	65	తేలు కాటు	94
గోరుచుట్టు	89	దగ్గు	20
గౌట్ (వాతరోగము)	49	ధాతునష్టము	18
చలిజ్వరము	53, 54	దీర్ఘవ్యాపితమగు కీళ్లనొప్పి	63
చిడుము	64	దుర్వాయువులను, క్రిమి	
చిన్న బిడ్డగుణము	32	జాలములను నశింపజేయు	
చుండు	11	మందులు	40
చెవిసోటు	39	నరముల సంబంధమగు	
జలుబు	36	బలహీనత	56
జలోదరము	10	నల్లులు	19
జ్వరము	71	నంజు	36
జ్వరఫలితమగు బల్ల	54	నులిపురుగులు	35, 73
జిగుటవిరేచనములు	44	న్యూమోనియా	60, 61
జీర్ణకారి	28	పంటినొప్పి	69
డయూరిటిస్సు	82, 83	పండ్లపాడి	70
డయఫారిటిస్సు	82, 83		

	పుట.		పుట.
పండ్లు వచ్చునపుడు		మూర్ఛ	46
కలుగు కలత	64	మూత్రకృచ్ఛము	90
పచ్చకామాల	53	మూత్రగ్రంథులయొక్క	
పశ్చిరికలు	53	క్షీణదశ	18
పాముకాటు	93	మూత్రాశయ శూలనొప్పి	24
పొండు రోగము	14	మూత్రవిసర్జనము స్వాధీనము	
పితృశయ సం. రాళ్లు	45	తప్పుట	52
స్నేహవ్యాధులు	35	మూత్రాశయవ్యాధి	55
పురుగుకాటు	24	మూలశంక	72
పులిపిరికాయలు		మెదడుయొక్క పోరల	
వేలు	57	వాపుదల	55
ప్రేగులనుండి రక్తము	45	రక్తస్రావము	45, 49
పొంగువచ్చు		రాచకురుపులు	13
ద్రవపదార్థములు	75	కొమ్ముపడినెము	17, 21
బట్టతల	11	తైంవాటరు	76
బలవర్ధకాషధములు	85	వ్రణములు	13
బల్ల పెరుగుట	54	వాంతులు	68, 92
బాధతోగూడిన పుండు	17	విరేచనకారులు	33, 34, 35, 36
బ్రాంకోన్యూమోనియా	23	వీర్యనష్టము	93
బిడ్డలయందు ఎముకలలో		వెక్కిలి	58
పట్టులేకుండుట	57	శీత కాలపుగజ్జి	21
మలబంధము	22, 32	శూలనొప్పి	24
మశూచి	85	సన్నిపాతజ్వరము	45, 46
ముఖపార్శ్వము వంకర		సెగవ్యాధి	47
పోవుట	44	హిస్టీరియా	51
మూగగజ్జి	39	తూయవ్యాధి	49, 56, 59

(అనుబంధము)

ఇన్‌ఫ్లూయెంజా (Influenza.)

తేలికగ చీర్లమగు నాహారము నియ్యవలెను. 10 గ్లాస్సుల వేడిపాలను మూడు లేక నాలుగు గంటలకొకసారి యియ్యవలెను. నిస్త్రాణ విశేషముగ నుండినయెడల పాలలో 2 ద్రాముల బ్రాందీని గలుపవలెను. దాహము విశేషముగ నుండినయెడల సాధారణ జలమునుగాని సోడావాటరునుగాని కొంచెకొంచెముగా నియ్యవలెను. వేడిపాలు రోగికి యిష్టము లేకపోయినయెడల చల్లారబెట్టినపాలను కొంచెకొంచెముగా ద్రాగునట్లు చేయవలయును. తలనొప్పియు వెన్నునొప్పియు నుండినయెడల నీక్రింది కౌషధయోగము నుపయోగింపవలెను.

ఆంటిపైరిన్ (Antipyrin) 10 గ్రా.

టింక్చర్ ఓపియం 10 మి.

కఫీన్ సిట్రస్ 1 గ్రా.

ఒక మోతాదువలననే ఉపయోగముగ నుండును; ఉపయోగించనియెడల, నొకగంట తరువాత 2 వ మోతాదును, రెండవ మోతాదునకు తరువాత 4 గంటలకు 3 వ మోతాదును, మూడవ మోతాదునకు పిమ్మట 24 గంటలకు 4వ మోతాదును, 4వ మోతాదునకు అనంతరము 30 గంటలకు 5 వ మోతాదును యియ్యవలెను. బిడ్డలకు 2 గ్రాముల ఆంటిపైరిన్ ను 15 మినిముల లైకర్ ఆమ్మోనియా ఆసిటేటిస్‌లోను 2 గ్రాముల జలములోను గలిపి యియ్యవలయును. బలీయమగు అనారపదార్థములను కొద్దిపరిమాణములలో దీక్షముగ నిచ్చుచు రోగి యొక్క ఆరోగ్యతను గాపాడవలయును. అనంతరము బలవర్ధకౌషధముగ ఫెర్రయి యెట్ క్వినీన్ సిట్రస్ ను యియ్యవలెను.

